

АРТИХОЛ (ARTIHOL)

CYNARA SCOLYMUS* [A05A X10**](#)

Киевский витаминный завод

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА:

табл. п/плен. оболочкой 200 мг блистер, № 10, № 30

Экстракт артишока сухой	200 мг	№ UA/5383/01/01 от 26.10.2011 до 26.10.2016
-------------------------	--------	---

табл. п/плен. оболочкой 400 мг блистер в пачке, № 40

Экстракт артишока сухой	400 мг	№ UA/5383/01/02 от 13.02.2014 до 26.10.2016
-------------------------	--------	---

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

фармакологические свойства обусловлены действием комплекса биологически активных веществ, которые входят в состав листьев артишока полевого (*Cynara scolymus*). Оказывает желчегонное, гепатопротекторное и мочегонное действие, также снижает содержание мочевины в крови. Инулин и другие вещества, которые содержатся в артишоке, улучшают обменные процессы в организме.

ПОКАЗАНИЯ:

хронический гепатит, цирроз печени, хронический некалькулезный холецистит, дискинезия желчных путей по гипокинетическому типу, хронический нефрит, ХПН.

ПРИМЕНЕНИЕ:

внутри у взрослых и детей в возрасте старше 12 лет применяют по 200–400 мг 3 раза в сутки до еды. У детей в возрасте 6–12 лет — по 200 мг 3 раза в сутки. Курс лечения — 2–3 нед, при необходимости возможно проведение повторных курсов по согласованию с врачом.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

известная повышенная чувствительность к артишоку и другим растениям семейства сложноцветных, непроходимость желчевыводящих и мочевыводящих путей, желчнокаменная болезнь, тяжелая печеночная недостаточность.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:

в случае длительного применения препарата в высоких дозах возможны диарея, боль в верхней части живота, тошнота и изжога, аллергические реакции.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

препарат применяют с осторожностью при заболеваниях, которые могут привести к непроходимости желчевыводящих путей, и при тяжелых заболеваниях печени. Если симптомы заболевания не исчезают или постоянно рецидивируют или в случае возникновения диареи, боли в животе, лечение препаратом следует прекратить и проконсультироваться с врачом. Препарат не следует применять при острых заболеваниях почек.

Применение в период беременности и кормления грудью. В период беременности и кормления грудью препарат применяют только по назначению врача в том случае, если

ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.
Дети. Детям в возрасте до 6 лет препарат не применяют.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:

терапевтический эффект антикоагулянтов кумаринового типа (например фенпрокумона, варфарина) может ослабляться, что требует коррекции дозы этих препаратов.

ПЕРЕДОЗИРОВКА:

возможно усиление побочных эффектов.
Лечение. Отмена препарата. Терапия симптоматическая.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.