Hau Giang Ph. JSC-HG Pharm **A05A X10****

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА:

табл. п/о, № 100

Экстракт желчи медицинской	25 мг
Экстракт артишока посевного	25 мг
Порошок куркумы высокой	50 мг

Прочие ингредиенты: крахмал, сахароза, магния карбонат, тальк, акация, шеллак, спирт поливиниловый, титана диоксид, железа оксид красный, железа оксид черный, воск карнауба, парафин твердый.

№ UA/6331/01/01 от 19.04.2007 до 19.04.2012

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

препарат способствует повышению секреторной функции гепатоцитов, что проявляется усилением выделения желчи (умеренно выраженный холеретический эффект) и стимуляцией синтеза желчных кислот. Рефлекторно повышает моторно-секреторную функцию пищеварительного тракта, угнетая процессы брожения в кишечнике. При регулярном применении препарата повышается детоксицирующая способность печени. Действие Холивера обусловлено свойствами биологически активных веществ, которые содержатся в экстракте желчи (холевая и хенодеоксихолевая кислоты, желчные пигменты, ХС) и экстрактах лекарственных растений — артишока посевного (Cynara scolymus) и куркумы длинной (Curcuma longa).

Желчные кислоты повышают секрецию желчи, способствующую повышению абсорбции жиров, ХС, витаминов A, D, E и K. Желчь стимулирует перистальтику кишечника и обладает антисептическими свойствами.

Артишок посевной оказывает желчегонное и мочегонное действие, снижает содержание мочевины в крови, нормализует обмен веществ, обладает гепатопротекторными свойствами, способствует выведению токсинов.

Куркума длинная оказывает противоязвенное действие, стимулирует образование желчи в печени и ее отток, устраняет чувство тяжести и метеоризм после еды, регулирует процесс пищеварения. Куркума способствует снижению уровня ХС в крови, а также оказывает антимикробное действие при дисбактериозе кишечника.

ПОКАЗАНИЯ:

цирроз печени, хронический гепатит, желтуха, холецистит, холангит, дискинезия желчных путей по гипокинетическому типу; олигурия вследствие сердечной недостаточности и цирроза печени; хронический запор вследствие атонии кишечника.

ПРИМЕНЕНИЕ:

взрослым препарат назначают по 2–4 таблетки 3 раза в сутки до или во время еды.
Детям в возрасте старше 3 лет назначают по 1–2 таблетки 3 раза в сутки до или во время еды.
Продолжительность курса лечения обычно составляет 10–20 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

повышенная чувствительность к компонентам препарата, обструктивная непроходимость желчных путей (обтурационная желтуха), острый гепатит, острая печеночная недостаточность, возраст до 3 лет.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:

препарат обычно хорошо переносят, однако у некоторых пациентов возможны аллергические реакции (гиперемия, кожная сыпь, зуд) или диарея.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

адекватные и тщательно контролируемые исследования по безопасности и эффективности препарата в период беременности и кормления грудью не проводили. Но учитывая, что компоненты препарата имеют натуральное происхождение и не являются потенциально опасными, возможно применение лекарственного средства в период беременности, если польза для матери превышает потенциальный риск для плода. При приеме препарата кормление грудью необходимо прекратить.
Препарат не влияет на скорость психомоторных реакций и в рекомендуемых дозах его можно применять лицам, которые управляют транспортными средствами и работают с потенциально опасными механизмами.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:

возможно усиление эффекта слабительных и мочегонных средств при одновременном применении с Холивером. Эффективность препарата при одновременном приеме энтеросорбентов снижается.

ПЕРЕДОЗИРОВКА:

возможна диарея, выраженные аллергические реакции (кожная сыпь, зуд). Препарат отменяют, назначают симптоматическое лечение.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

в сухом, защищенном от света месте при температуре до 25 °С.