

# КАНЕФРОН Н

## Латинское название

CANEPHRON N

## Форма выпуска

Раствор для приема внутрь

## Состав

100 г содержат водно-спиртовой экстракт\* 29 г

\* - для приготовления 100 г водно-спиртового экстракта используется 600 мг травы золототысячника, 600 мг корня любистока лекарственного, 600 мг листьев розмарина. Прочие ингредиенты: этанол 16.0-19.5 об.%, вода очищенная.

## Упаковка

Флакон 100 мл.

## Фармакологическое действие

Канефрон Н - комбинированный препарат растительного происхождения. Оказывает комплексное действие: диуретическое, спазмолитическое, противовоспалительное и антибактериальное.

## Показания

- хронические циститы и пиелонефриты;
- хронический гломерулонефрит, хронический интерстициальный нефрит;
- профилактика мочекаменной болезни (в т.ч. после удаления конкрементов).

## Противопоказания

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата Канефрон Н.

## Применение при беременности и кормлении грудью

Вопрос о возможности применения препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) решается врачом индивидуально.

## Способ применения и дозы

Внутрь, разведя в небольшом количестве воды.

*Взрослым:* по 50 капель 3 раза в день

*Детям школьного возраста:* по 25 капель 3 раза в день

*Детям дошкольного возраста:* по 15 капель 3 раза в день

*Грудным детям:* по 10 капель 3 раза в день

После ослабления остроты заболевания следует продолжить лечение Канефроном Н в течение 2-4 недель. При необходимости, например, чтобы смягчить горький вкус для детей, капли можно принимать вместе с другими жидкостями.

## Побочные действия

*Возможно:* аллергические реакции на компоненты препарата.

При хранении возможно помутнение раствора и выпадение незначительного осадка, однако это не влияет



### **Особые указания**

Канефрон Н может быть назначен как для базисной терапии, так и в качестве дополнительного средства.

на активность препарата. Перед употреблением препарат следует взбалтывать.

При применении препарата у больных сахарным диабетом следует иметь в виду, что усваиваемые углеводы, содержащиеся в одном драже, составляют менее 0.03 ХЕ.

Раствор содержит 16.0-19.5 об.% этанола, поэтому данную лекарственную форму не рекомендуют применять после успешного лечения хронического алкоголизма.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Препарат не снижает способность к управлению транспортом и работе с машинами.

### **Лекарственное взаимодействие**

Применение Канефрона Н в комбинации с антибактериальными препаратами повышает эффективность антибактериальной терапии.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами до настоящего времени не известно.

### **Условия хранения**

Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

### **Срок годности**

3 года.