Ниттифор

Форма выпуска
Крем, лосьон

Состав
Ниттифор Крем

1 г крема содержит:

Активное вещество: перметрин 10 мг;

Вспомогательные вещества: косметический крем с кондиционером.

Ниттифор Лосьон

1 мл лосьона содержит:

Активное вещество: перметрин 5 мг.

Упаковка
Крем - Флакон 115 г.

Лосьон - Флакон 50 мл.

Фармакологическое действие
Средство педикулицидное Ниттифор крем представляет собой готовый к применению крем оранжевого цвета со специфическим запахом, в состав которого в качестве действующего вещества входит 1% перметрина. Средство высокоэффективно по отношению к имаго, личинкам и яйцам вшей при 10 минутном контакте их с ним.

Средство по классификации опасности ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу мало опасных соединений при введении в желудок и нанесении на кожу. В рекомендуемом режиме применения не обладает сенсибилизирующим, местным раздражающим и кожно-резорбтивным действием.

Ниттифор, показания к применению
Для уничтожения головных и лобковых вшей и их гнид у взрослых и детей с 5 лет.

Противопоказания
Не рекомендуется обрабатывать детей до 5 лет, беременных и кормящих женщин, а также людей, имеющих различные кожные заболевания, или с проявлениями аллергии к медицинским и косметическим средствам.

Способ применения и дозы
Лосьон: наружно, волосы головы или волосистые части тела (при лобковом педикулезе) обильно увлажняют лосьоном с помощью ватного тампона, втирая препарат в корни волос. Обычно на одного человека расходуется от 30 до 60 мл препарата, в зависимости от степени зараженности насекомыми, густоты и длины волос. Через 40 мин с обработанных частей тела средство смывают теплой проточной водой с мылом или шампунем, волосы головы ополаскивают 5% водным раствором уксусной кислоты, затем расчесывают частым гребнем для удаления погибших насекомых. При повторном заражении повторяют обработку, но не более 2 раз в месяц.

Крем: наружно (перед применением средства флакон следует встряхнуть), после мытья волос обычным шампунем ополаскивают водой и просушивают полотенцем насухо, затем крем равномерно наносят на волосы головы или волосистые части тела (при лобковом педикулезе), втирая в корни волос. Обычно на одного человека расходуется 10–30 г препарата, в зависимости от степени зараженности насекомыми,

густоты и длины волос. Через 10 мин с обработанных частей тела средство смывают теплой проточной водой с мылом или шампунем, волосы головы ополаскивают 5% водным раствором уксусной кислоты, затем расчесывают частым гребнем для удаления погибших насекомых.

Особые указания
При обнаружении педикулеза в коллективах обработку головы и тела следует проводить профилактически.

Условия хранения
При комнатной температуре 15–25 °С. Отдельно от пищевых продуктов и лекарств.

Срок годности
2 года