

1. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ГРУППА:

НПВС.

ЛЕЧЕБНЫЕ ЭФФЕКТЫ:

- Противовоспалительный;
- Обезболивающий;
- Жаропонижающий.

2. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

ПРЕПАРАТ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ:

- Ревматоидного артрита, несуставного ревматизма, остеоартроза;
- Повреждения сухожилий, мягких тканей, связок, сопровождающихся воспалением;
- Умеренного болевого синдрома различного происхождения.

3. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДОЗИРОВКА БРУФЕНА В ФОРМЕ ТАБЛЕТОК:

- Дети:
по 20 мг на каждый кг массы тела в день, разделённые на несколько приёмов;
- Взрослые:
по 1,2-1,8 г в день, разделённые на несколько приёмов.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДОЗИРОВКА БРУФЕНА В ФОРМЕ МАЗИ:

- Наносить крем на поражённый участок тонким слоем 3-4 раза в день на протяжении 2-3 недель.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Согласно инструкции, пациенты, страдающие нарушениями деятельности печени и/или почек нуждаются в подборе индивидуального режима дозирования.

Информация о применении составлена согласно инструкции от производителя

4. ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

- Пищеварительная система: диспепсия, кровотечение;
- Система крови: снижение количества тромбоцитов;
- Мочевыделительная система: нефротоксическое действие;
- Реакции повышенной чувствительности: покраснение кожи, жжение, зуд, пощипывание, сыпь в месте применения.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Язвенная болезнь желудка и/или двенадцатиперстной кишки в острой фазе;
- Индивидуальная непереносимость или повышенная чувствительность к Бруфену или его компонентам;
- Беременность, лактация, масса тела менее 7 кг;
- Аспириновая астма.

ПРИМЕНЯТЬ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ:

- Хроническая сердечная недостаточность;
- Различные заболевания печени и/или почек.

6. ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И ЛАКТАЦИИ

Беременным женщинам и кормящим матерям принимать препарат не следует.

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Значимого негативного взаимодействия Бруфена с другими лекарственными средствами не описано.

8. ПЕРЕДОЗИРОВКА

Передозировка Бруфеном не описана.

9. ФОРМА ВЫПУСКА

- Таблетки, пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 200, 400, 600 или 800 мг - 7, 10, 14 или 20 шт.

- Сашэ, 600 мг - 30 шт.
- Сироп, 100 мг/5 мл - фл. 100 мл,

10. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- Сухое тёмное место, исключающее доступ детей и солнечного света.

Рекомендованная температура хранения Бруфена

- комнатная.

Рекомендованный срок хранения

- различный, зависит от лекарственной формы и фирмы-производителя, указывается на упаковке.

11. СОСТАВ

1 ТАБЛЕТКА:

- ибупрофен - 800 мг.

100 ГРАММ КРЕМА:

- ибупрофен - 5 мг.

1МЛ СИРОПА:

- ибупрофен - 20 мг.

12. УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Препарат отпускается по рецепту лечащего врача.