

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**для специалистов**  
**по медицинскому применению лекарственного средства**  
**Бензилбензоат**

**Международное непатентованное название:** Benzyl benzoate.

**Форма выпуска:** эмульсия для наружного применения 200 мг/1 г.

**Описание лекарственной формы:** эмульсия белого цвета со слабым специфическим запахом, пенящаяся при взбалтывании. Допускается расслоение эмульсии, которое устраняется при взбалтывании.

**Состав:** 1 г эмульсии содержит в качестве действующего вещества 200 мг бензилбензоата.  
**Вспомогательные вещества:** макрогола цетостеариловый эфир, мыло туалетное твердое, шампунь, вода очищенная.

**Фармакотерапевтическая группа:** средства для уничтожения эктопаразитов, включая средства против чесоточного клеща

Код АТС: Р03А Х01.

**Фармакологические свойства:**

**Фармакодинамика**

Активен в отношении чесоточных клещей, а также головных и лобковых вшей.

Проникает через хитиновый покров и накапливается в организме клеща (или вши) в токсических концентрациях, вызывая тем самым гибель личинок и взрослых особей; не действует на яйца.

**Фармакокинетика**

Проникает в верхние слои эпидермиса, в системный кровоток не всасывается. Под действием бензилбензоата гибель чесоточных клещей наступает через 7-32 минуты, вшей – через 2-5 часов.


**Показания к применению**

- чесотка;
- головной и лобковый педикулез.

**Способ применения и дозировка**

При чесотке курс лечения продолжается 4 дня. В первый день обработку проводят вечером перед сном после тщательного мытья под душем теплой водой с мылом. Эмульсию втирают в кожу рук, затем туловища и ног, включая подошвы и пальцы. После обработки кожи следует использовать только чистое белье и одежду. На 2-ой и 3-ий дни делают перерыв в лечении, при этом остатки эмульсии не смывают с кожи.

На 4-й день вечером больной моется с мылом и проводит втирание эмульсии, как в первый день, используя оставшуюся эмульсию, и еще раз меняет все белье. Руки после обработки не следует мыть в течение 3 часов, в последующем руки обрабатывают эмульсией после каждого мытья. В случае смывания эмульсии с других участков кожи их



нужно также повторно обработать. Эмульсию полностью смывают с кожи на пятый день лечения.

*При головном или лобковом педикулезе 10-30 мл бензилбензоата наносят на волосистую часть тела на 20-30 минут, после чего смывают проточной водой. Обработанные участки желательно прополоскать подкисленной столовым уксусом водой.*

Взрослым назначают эмульсию в концентрации 200 мг/1 г, а детям до 5 лет – 100 мг/1 г, для чего эмульсию в концентрации 200 мг/1 г перед употреблением разводят кипяченой водой 1:1.

### **Побочное действие**

Местные реакции: возможны (особенно у детей) ощущение жжения, раздражение кожи.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Гнойничковые заболевания и повреждения кожи. Не рекомендуется использование детям до 3-х лет.

### **Применение при беременности и лактации**

*В период беременности применение лекарственного средства противопоказано; при необходимости применить лекарственное средство в период лактации следует на время лечения кормление приостановить.*

### **Передозировка**

При соблюдении рекомендуемого способа применения случаи передозировки неизвестны.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Нежелательно одновременное назначение с другими лекарственными средствами для наружного применения.

### **Особые указания**

Лечение больных, выявленных в одном очаге, а также контактных лиц, должно проводиться одновременно во избежание заражения.

Сохранение зуда после лечения не является показанием для назначения дополнительного курса специфической терапии. Зуд является реакцией организма на убитого клеща и продукты его жизнедеятельности и исчезает при назначении антигистаминных лекарственных средств и мазей с глюкокортикоидами.

После лечения необходим врачебный контроль в течение 2 недель, а при наличии осложнений и более длительное время.


Все предметы, которые соприкасались с зараженной кожей, должны быть подвергнуты тщательной обработке. Постельные принадлежности и белье, полотенца кипятят в растворе стирального порошка в течение 5-10 минут.

Верхнюю одежду проглаживают с обеих сторон горячим утюгом. Вещи, не подлежащие термической обработке, вывешиваются на открытый воздух на 3 дня. Обувь, игрушки и прочие предметы исключают из использования на 5 дней и помещают в целлофановый пакет. Матрацы, подушки, одеяла также исключаются из использования на 5 дней или подвергаются камерной дезинфекции. Мягкую мебель можно обработать препаратами для дезинсекции. В квартире необходимо провести уборку, мытье полов с моющими средствами или с добавлением дезинфицирующих средств.

Необходимо избегать попадания лекарственного средства в глаза, нос, рот.

При попадании лекарственного средства:

- в рот: рот прополоскать обильно водой или 2% теплым раствором питьевой соды и обеспечить покой;



- в желудок: желудок промывают 1%-2% раствором питьевой соды, водной смесью жженой магнезии и активированного угля;
- в глаза: тщательно промыть водой или раствором питьевой соды.

### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25<sup>0</sup>C.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности:**

2 года. Срок годности указан на упаковке.

Данное лекарственное средство нельзя использовать после даты, указанной на упаковке.

### **Условия отпуска из аптек**

Лекарственное средство отпускается без рецепта врача.

### **Форма выпуска и упаковка**

По 100 г и 150 г в пластмассовых флаконах, укупоренных колпачками полимерными винтовыми. Каждый флакон вместе с листком-вкладышем для потребителей помещен в пачку из картона