Спрегаль

Форма выпуска
Аэрозоль для наружного применения

Состав
10 г раствора содержат: эсдепаллетрин (эсбиол) 66 мг, пиперонила бутоксид 531 мг;
вспомогательные вещества: этанол, диэтиленгликоля моноэтиловый эфир, макроглицериды, пропеллент HFA 134a.

Упаковка
Флакон 160 г.

Фармакологическое действие
Спрегаль - препарат для лечения чесотки. Входящий в состав препарата эсдепаллетрин является нейротоксичным ядом для насекомых. Механизм действия заключается в нарушении катионного обмена мембран нервных клеток. Пиперонила бутоксид усиливает действие эсдепаллетрина.

Спрегаль, показания к применению
Лечение чесотки.

Противопоказания
- бронхиальная астма;
- хронический обструктивный бронхит;
- индивидуальная непереносимость одного из компонентов препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью
Применение препарата при беременности возможно только в случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

При необходимости применения препарата в период лактации следует отказаться от грудного вскармливания на период лечения.

Способ применения и дозы
Лечение предпочтительно начинать вечером (после 18-19 ч), чтобы препарат действовал в течение ночи. После нанесения препарата не следует мыться.

Перед употреблением необходимо тщательно встряхнуть баллон. Путем распыления препарат тщательно наносят на поверхность тела (кроме кожи лица и головы) на расстоянии 20-30 см от поверхности кожи.

Препарат вначале наносят на туловище, а потом на конечности (обработанные участки начинают лосниться). Особенно тщательно препарат наносят между пальцами рук, ног, в области подмышек, промежности, на все сгибы и пораженные участки и оставляют на коже на 12 ч. Через 12 ч необходимо тщательно вымыться с мылом и вытереться.

Как правило, однократного применения Спрегаля достаточно. Однако необходимо иметь в виду, что, даже в случае эффективности проведенного лечения, зуд и другие симптомы могут наблюдаться еще 8-10 дней. Если по истечении этого срока симптомы сохраняются, можно нанести препарат повторно.

При лечении детей и новорожденных во время распыления препарата необходимо закрыть им нос и рот салфеткой; в случае смены пеленок необходимо заново обработать всю зону ягодиц. При локализации расчесов на лице их обрабатывают ватным тампоном, смоченным Спрегалем.

Побочные действия
Местные реакции: возможно появление ощущения легкого жжения, которое обычно быстро проходит.

Особые указания
Препарат следует распылять в хорошо проветриваемом помещении.
Одного баллона препарата Спрегаль достаточно для лечения 3-4 человек.

Необходимо избегать попадания препарата в глаза и на слизистые оболочки. При случайном попадании в глаза следует тщательно промыть их теплой водой.

Во избежание вторичного заражения необходимо обработать постель и одежду препаратом а-пар.

Препарат противопоказан при бронхиальной астме, обструктивном бронхите только из-за аэрозольной формы. В этом случае возможно нанесение препарата на кожу ватным тампоном, смоченным Спрегалем.

Лекарственное взаимодействие
Лекарственное взаимодействие препарата Спрегаль неизвестно.

Передозировка
В настоящее время о случаях передозировки препарата Спрегаль не сообщалось.

Условия хранения
Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при комнатной температуре.

Срок годности
2 года.