

# Дона

## Латинское название

Dona

## Форма выпуска

Раствор для в/м введения.

## Состав

1 ампула содержит:

глюкозамин (в форме сульфата) 400 мг

Вспомогательные вещества: натрия хлорид, лидокаина гидрохлорид, вода д/и.

Растворитель: диэтаноламин 24 мг, вода д/и - до 1 мл.

## Упаковка

6 ампул.

## Фармакологическое действие

Дона восполняет эндогенный дефицит глюкозамина, стимулирует синтез протеогликанов и гиалуроновой кислоты синовиальной жидкости. Увеличивает проницаемость суставной капсулы, восстанавливает ферментативные процессы в клетках синовиальной мембраны и суставного хряща.

Противовоспалительное действие глюкозамина сульфата обусловлено блокированием образования супероксидных радикалов макрофагами и ингибированием лизосомальных ферментов.

Способствует фиксации серы в процессе синтеза хондроитинсерной кислоты, облегчает нормальное отложение кальция в костной ткани. Тормозит развитие дегенеративных процессов в суставах, восстанавливает их функцию, уменьшая суставные боли.

## Показания

— остеоартроз различной локализации (в т.ч. артроз коленного и тазобедренного суставов, межпозвоночный остеохондроз, спондилоартроз);

— хондромалиция надколенника;

— лопаточно-плечевой периартрит.

## Противопоказания

— повышенная чувствительность к глюкозамина сульфату и другим компонентам препарата;

— порошок для приема внутрь содержит аспартам и поэтому противопоказан при фенилкетонурии;

— раствор для в/м введения содержит лидокаин и поэтому противопоказан пациентам с тяжелыми нарушениями проводимости сердца и острой сердечной недостаточностью, при указаниях в анамнезе на эпилептиформные судороги, детям в возрасте до 12 лет, при беременности и в период лактации, при повышенной чувствительности к лидокаину.



**Способ применения и дозы**

В/м вводят по 1 амп. (400 мг) 3 раза в неделю в течение 4-6 недель. Перед применением содержимое 1 амп. (2 мл) развести прилагаемым растворителем (1 мл) в одном шприце.

В/м введение можно сочетать с приемом препарата внутрь.

**Побочные действия**

*Со стороны пищеварительной системы:* в отдельных случаях - метеоризм, диарея, запор.

*Аллергические реакции:* в отдельных случаях - крапивница, зуд.

*Эффекты, обусловленные действием лидокаина (раствор для в/м введения):* возможны тошнота, рвота, сонливость, диплопия, головная боль, головокружение, онемение языка и слизистой оболочки полости рта, тремор, эйфория, дезориентация, нарушение сердечной деятельности.

**Особые указания**

С осторожностью следует применять препарат в форме раствора для инъекций у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, артериальной гипотензией.

С осторожностью назначают раствор для инъекций одновременно с бета-адреноблокаторами, дигитоксином, аймалином, амиодароном, верапамилем, хинидином, новокаинамидом, гексеналом, тиопенталом натрия, ингибиторами МАО, полимиксином В, снотворными или седативными средствами, циметидином.

Использование в педиатрии

Адекватных и строго контролируемых исследований по безопасности и эффективности препарата Дона у детей в возрасте до 12 лет не проводилось.

**Условия хранения**

Препарат следует хранить при температуре  $25 \pm 5^\circ\text{C}$ .

**Срок годности**

2 года.