

Анатоксин стафилококковый очищенный жидкий

Форма выпуска

Суспензия для инъекций

Состав

1,0 мл препарата содержит от 10 до 14 ЕС (единиц связывания) стафилококкового анатоксина. Препарат не содержит консервантов и антибиотиков.

Упаковка

Ампулы 1 мл, 10 ампул в картонной пачке.

Фармакологическое действие

Анатоксин стафилококковый вызывает образование специфических антитоксических антител против стафилококка и его токсина. Иммуномодулятор и иммунокорректор.

Анатоксин стафилококковый очищенный жидкий, показания к применению

Препарат применяется для специфической иммунотерапии взрослых людей, страдающих острой или хронической (в стадии обострения) стафилококковой инфекцией (фурункулез, гидраденит, панариций, флегмона, пиодермия, остеомиелит, маститы, воспалительные гинекологические, урологические, отоларингологические заболевания и др.)

Противопоказания

Противопоказаниями для применения анатоксина стафилококкового очищенного, являются: острые инфекционные и неинфекционные заболевания не стафилококковой этиологии, хронические заболевания не стафилококковой этиологии в стадии обострения или декомпенсации — прививки проводят не ранее чем через 1 месяц после выздоровления (ремиссии).

С осторожностью применять, при наличии в анамнезе тяжелых аллергических реакций (анафилактический шок, отек Квинке); в период беременности (т.к. нет достаточных данных о безопасности применения препарата у беременных женщин).

Способ применения и дозы

Анатоксин стафилококковый очищенный жидкий вводят подкожно под угол лопатки, чередуя правую и левую стороны при каждой последующей инъекции (инъекции в руку исключаются).

Полный курс лечения включает 7 инъекций препарата, осуществляемых через 2 дня, в следующих нарастающих дозах: 0,1 - 0,3 - 0,5 - 0,7 - 0,9 - 1,2 - 1,5 мл. При быстром клиническом эффекте курс терапии по усмотрению лечащего врача может быть сокращен до 5 инъекций. Лечение анатоксином стафилококковым очищенным жидким может проводиться параллельно с общей и местной терапией, кроме сывороточных антистафилококковых препаратов, таких как антистафилококковый иммуноглобулин и антистафилококковая плазма.

Препарат во вскрытой ампуле хранению не подлежит.

Побочные действия

Введение препарата может сопровождаться общими, местными и очаговыми реакциями.

Общие реакции характеризуются легкой слабостью, недомоганием, изредка повышением температуры до 37,5 °С.

Для местных реакций характерны гиперемия и легкая болезненность в месте инъекции, исчезающие через 1-2 дня.

Нередко после инъекции препарата может иметь место очаговая реакция, т.е. обострение процесса в месте его локализации.

Возникновение указанных реакций не является противопоказанием для продолжения лечения. Однако при наличии одновременно общих и местных реакций интервал между предыдущей и последующей инъекциями препарата рекомендуется увеличить на 1 день. Развитие очаговой реакции не требует увеличения интервала между инъекциями.

Лекарственное взаимодействие

Лечение анатоксином стафилококковым очищенным может проводиться одновременно с другой общей у, местной терапией, за исключением иммуноглобулинов и антистафилококковой плазмы.

Условия хранения

В соответствии с СП 3.3.2. 1248-03 при температуре от 2 до 8 °С в сухом, защищенном от света месте. Замораживание не допускается.

Срок годности

2 года.