

# Биоспорин

## Биоспорин

### Состав и форма выпуска

**Биоспорин** сухой порошок для приготовления раствора для приема внутрь

Биоспорин представляет собой живые бактерии *Bacillus subtilis* и *Bacillus lichiniformis*, лиофильно высушенные в сахарозно-желатиновой среде; в ампулах (флаконах) по 1, 2 или 10 доз в упаковке по 10 шт.

### Фармакологическое действие

Биоспорин - пробиотик. Оказывает местное бактериостатическое действие на возбудителей острых кишечных инфекций. Эффективен при инфекционных гинекологических заболеваниях. Повышает противоинфекционную устойчивость организма. Ускоряет процесс реабилитации после оперативных вмешательств. Биоспорин применяется у детей от одного года и взрослых при острых кишечных инфекциях, дисбактериозе кишечника (для коррекции микрофлоры кишечника); в гинекологической практике - при кандидозе влагалища и вульвы, бактериальном вагинозе; для профилактики гнойно-септических послеоперационных осложнений

## Биоспорин, показания к применению

Биоспорин предназначен для профилактики и лечения у детей от одного года и взрослых:

- острые кишечные инфекции, вызванные бактериями рода *Salmonella*, *Shigella*, энтеропатогенными *E. coli*, *Proteus*, *Staphylococcus*, *Candida* (дизентерия, сальмонеллез, пищевые токсикоинфекции);
- дисбактериоз кишечника различной этиологии, в т.ч. возникающий в результате лечения антибиотиками (для коррекции микрофлоры кишечника);
- кандидоз влагалища и вульвы у женщин репродуктивного возраста и у беременных;
- лечение бактериального вагиноза / вагинита;
- профилактика гнойно-септических послеоперационных осложнений.

### Противопоказания

Индивидуальная непереносимость (в т.ч. гиперчувствительность в анамнезе) компонентов Биоспорина..

### Применение в период беременности и лактации:

Биоспорин применяется у беременных и кормящих женщин для лечения кандидоза влагалища (вульвы) и бактериального вагиноза (вагинита).

### Способ применения и дозы

Содержимое ампулы (флакона) Биоспорина растворяют кипяченой водой комнатной температуры. В стакан наливают воду из расчета 1 чайная ложка воды на 1 дозу Биоспорина. Полученную взвесь применяют внутрь или используют для орошений влагалища или пропитывания тампонов для введения во влагалище.

Дозы Биоспорина у детей: по 1 дозе 2 раза в день в течение 5-7 дней;

Дозы Биоспорина у взрослых: по 2 дозы 3 раза в день в течение 5-7 дней.

### Побочные действия

Возможны реакции индивидуальной непереносимости.

### Особые указания

Не пригоден к применению Биоспорин с измененными физическими свойствами (высушенная масса темно-коричневого цвета, резко уменьшенная в объеме), при нарушенной упаковке (треснувшие ампулы).

### Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

**Срок годности** - 3 года.