

# Циннабсин

## Форма выпуска

Таблетки для рассасывания гомеопатические.

## Состав

1 таб.:

- Cinnabaris D3 25 мг
- Hydrastis D3 25 мг
- Kalium bichromicum D3 25 мг
- Echinacea D1 25 мг

Вспомогательные вещества: лактоза, магния стеарат, крахмал пшеничный.

## Упаковка

100 шт.

## Фармакологическое действие

Циннабсин - гомеопатический препарат, применяемый при синуситах.

Оказывает противовоспалительное и противоотечное действие, уменьшает повышенную секрецию в пазухах носа. Облегчает носовое дыхание. Способствует укреплению иммунитета.

## Показания

В составе комплексной терапии острого и хронического воспаления придаточных пазух носа (гайморит, фронтит и др.).

## Противопоказания

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Не рекомендуется назначать препарат детям в возрасте до 3 лет из-за недостаточности клинических данных.

## Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата Циннабсин при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

## Способ применения и дозы

Внутрь.

При остром заболевании детям от 3 до 6 лет назначают по 1 таб. каждые 2 ч (не более 6 раз/сут) до наступления улучшения, далее - по 1/2 таб. 3 раза/сут до полного выздоровления.

Детям от 6 до 12 лет назначают по 1 таб. каждый час (не более 7-8 раз/сут) до наступления улучшения, далее - по 1 таб. 2 раза/сут до полного выздоровления.

Взрослым и детям старше 12 лет назначают по 1 таб. каждый час (не более 12 раз/сут) до наступления улучшения, далее - по 1-2 таб. 3 раза/сут до полного выздоровления.

При хронических заболеваниях детям от 3 до 6 лет назначают по 1/2 таб. 3 раза/сут; детям от 6 до 12 лет - по 1 таб. 2 раза/сут; взрослым и детям старше 12 лет назначают по 1 таб. 3 раза/сут до улучшения состояния.

Курс лечения для профилактики рецидивов при хроническом течении заболеваний - до 2 мес.

Таблетки Циннабсин следует принимать за 30 мин до или через 30 мин после приема пищи, медленно рассасывая во рту. Детям от 3 до 5 лет рекомендуется растворять таблетку в небольшом количестве жидкости или давать в измельченном виде под язык.

## Побочные действия



Возможны: аллергические реакции; в единичных случаях - кожные реакции, при развитии которых препарат следует отменить.

После применения препарата может наблюдаться повышенное слюноотделение (в этом случае следует уменьшить дозу или прекратить прием препарата).

#### **Особые указания**

При применении Циннабсина возможно временное ухудшение состояния. В данном случае пациент должен прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

При применении Циннабсина допускается использование других лекарственных препаратов.

Пациент должен быть информирован, что в случае отсутствия терапевтического эффекта в течение 3 дней препарат следует отменить и проконсультироваться с врачом.

Прием препарата Циннабсин может оказывать отрицательное влияние на пациентов с целиакией и непереносимостью лактозы.

#### **Лекарственное взаимодействие**

Лекарственное взаимодействие препарата Циннабсин с другими лекарственными средствами не установлено.

#### **Передозировка**

В настоящее время о случаях передозировки препарата Циннабсин не сообщалось.

#### **Условия хранения**

Препарат следует хранить в сухом, недоступном для детей месте при комнатной температуре.

#### **Срок годности**

4 года.