

Корилип

Корилип/Corylip

Состав и форма выпуска

Корилип - суппозитории для ректального применения: 1 супп. содержит кокарбоксилазы гидрохлорид 0,025 г, рибофлавин 0,002 г, липоевая кислота 0,012 г, вспомогательные вещества: какао масло или твердый жир — до массы 0,95 г; в упаковке 10 шт.



Фармакологическое действие

Корилип оказывает метаболическое действие.

Корилип, показания к применению

Корилип применяется в качестве монотерапии или в комплексном лечении различных патологических состояний у детей, в т.ч.:

хроническая тканевая гипоксия;

снижение иммунитета (бактериальные и вирусные инфекции);

хронические соматические заболевания, хроническая интоксикация, состояние после перенесенных тяжелых заболеваний, нарушение питания (гипотрофия);

период интенсивного роста и становления новых функций у ребенка;

интенсивная физическая и умственная нагрузка, стресс;

как общеукрепляющее средство в профилактических целях в период эпидемии инфекционных заболеваний.

Противопоказания

Гиперчувствительность;

проктит;

аноректальные кровотечения.

Побочные действия

Редко — аллергические реакции: крапивница, зуд, бронхоспазм; диспепсия.

Способ применения и дозы

Корилип применяют ректально, после предварительного опорожнения кишечника. Детям от 1 года до 6 лет — 1 супп./сут, от 6 до 14 лет — 1-2 супп./сут. Длительность курса лечения — 10 дней. Всего — 3-4 курса с промежутками в 20 дней (3-4 мес).

Условия хранения и срок годности

В защищенном от света месте, при температуре не выше 9 °С. Срок годности - 2 года.