Лавомакс

Форма выпуска
таблетки, покрытые оболочкой.

Состав
1 таблетка содержит тилорон 0,125 г, *вспомогательные вещества:* до получения таблетки массой 0,39 г — магния гидроксикарбоната гидрат (магний углекислый основной водный); повидон (ПВП низкомолекулярный медицинский, коллидон); кальция стеарат; кремния диоксид коллоидный (аэросил); воск пчелиный; вазелиновое масло; сахароза; тальк; тропеолин 0; титана диоксид; полиэтиленгликоль высокомолекулярный 6000).

Упаковка
в упаковке 6 или 10 шт.

Фармакологическое действие
ЛАВОМАКС стимулирует образование в организме α,β и γ-интерферонов. Основными продуцентами интерферона в ответ на введение Лавомакса являются клетки эпителия кишечника, гепатоциты, Т-лимфоциты и нейтрофилы. После приема внутрь максимум продукции интерферона определяется в последовательности кишечник-печень-кровь через 4-24 часа.

Лавомакс обладает иммуномодулирующим и противовирусным эффектом. Стимулирует стволовые клетки костного мозга, в зависимости от дозы усиливает антителообразование, уменьшает степень иммунодепрессии, восстанавливает соотношение Т-хелперы/Т-супрессоры.

Эффективен против различных вирусных инфекций, в том числе против вирусов гриппа, других острых респираторных вирусных инфекций, вирусов гепатита и герпесвирусов. Механизм антивирусного действия связан с ингибированием трансляции вирус-специфических белков в инфицированных клетках, в результате чего подавляется репродукция вирусов.

После приема внутрь Лавомакс быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта. Биодоступность составляет 60%. Около 80% препарата связывается с белками плазмы. Выводится препарат практически в неизменном виде с калом (70%) и мочой (9%). Период полувыведения (Т1/2) составляет 48 часов. Препарат не подвергается биотрансформации и не накапливается в организме.

Лавомакс, показания к применению
У взрослых для лечения вирусных гепатитов А,В,С, герпетической инфекции, цитомегаловирусной инфекции, в составе комплексной терапии инфекционно-аллергических и вирусных энцефаломиелитов (рассеянный склероз, лейкоэнцефалиты, увеоэнцефалиты и др.), в составе комплексной терапии урогенитального и респираторного хламидиоза, для лечения и профилактики гриппа и других ОРВИ.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к препарату. Период беременности и лактации. Детский возраст (до 7 лет).

Способ применения и дозы

Препарат принимается внутрь после еды. Для неспецифической профилактики вирусного гепатита А – 0,125г в неделю в течение 6 недель. Для лечения вирусного гепатита А – первый день по 0,125г 2 раза, затем по 0,125г через 48 часов. Курс лечения 1,25г (10 таблеток). Для лечения острого гепатита В – первый и второй дни по 0,125г, затем по 0,125г через 48 часов. Курс лечения2г (16 таблеток), при затяжном течении гепатита В – 0,125г 2 раза в сутки в первый день, затем по 0,125г через48 часов. Курс лечения 2,5г (20 таблеток).

При хроническом гепатите В – начальная фаза лечения (2,5г – 20 таблеток) – первые два дня по 0,25г, затем 0,125г в неделю. Курсовая доза Лавомакса от 3,75г до 5г, длительность терапии 3,5-6 месяцев в зависимости от результатов биохимических, иммунологических, морфологических исследований, отражающих степень активности процесса. При остром гепатите С – первый и второй дни по 0,125, затем по 0,125г через 48 часов. Курс лечения 2,5г (20 таблеток). При хроническом гепатите С – начальная фаза лечения (2,5г – 20 таблеток) – первые два дня по 0,25г, затем 0,125г через 48 часов. Фаза продолжения (2,5г – 20 таблеток) – по 0,125г в неделю. Курсовая доза Лавомакса - 5г, длительность терапии – 6 месяцев в зависимости от результатов биохимических, иммунологических, морфологических маркеров активности процесса.

При лечении гриппа и других ОРВИ – в первые двое суток болезни по 0,125г, затем через 48 часов по 0,125г. Курс лечения 0,750г.

Для профилактики гриппа и других ОРВИ – 0,125г один раз в неделю в течение 6 недель.

Для лечения герпетической, цитомегаловирусной инфекции – первые двое суток по 0,125г, затем через 48 часов по 0,125г. Курсовая доза 2,5г.

При урогенитальном и ремпираторном хламидиозе – первые двое суток по 0,125г, затем через 48 часов по 0,125г. Курсовая доза 1,25г.

При комплексной терапии нейровирусных инфекций дозу устанавливают индивидуально, курс лечения составляет 4 недели.

Побочные действия
Возможны аллергические реакции, диспептические явления, кратковременный озноб.

Особые указания
Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами
Применение препарата не оказывает влияния на способность к вождению автотранспорта и занятиям другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Лекарственное взаимодействие
Клинически значимого взаимодействия препарата Лавомакс® с антибиотиками, средствами стандартной терапии вирусных и бактериальных заболеваний, алкоголем не выявлено.
Совместим с антибиотиками и средствами стандартной терапии вирусных и бактериальных заболеваний.

Передозировка
Случаи передозировки препарата Лавомакс® неизвестны.

Условия хранения
В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Срок годности
2 года.