

# Сангвиритрин

## Форма выпуска

Таблетки, растворимые в кишечнике.

## Состав

1 таблетка содержит сангвиритрин (в пересчете на 100% вещество) 0,005 г, сахар (сахароза) 0,093 г.



## Упаковка

30 шт.

## Фармакологическое действие

Сангвиритрин оказывает антибактериальное, бактериостатическое, противогрибковое, противопротозойное действие.

## Показания

Комплексная терапия острых и хронических инфекционно-воспалительных заболеваний: острые кишечные инфекции (дизентерия, сальмонеллез, пищевые токсикоинфекции), раневые инфекции и различные инфекционные осложнения, обусловленные патогенной микрофлорой (рековалесцентное бактерионосительство), заболевания, связанные с нарушением нормальной микрофлоры (дисбактериозы), а также заболевания, вызванные патогенными грибами (фарингомикоз, кандидоз, микроспория).

## Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам Сангвиритрина, заболевания печени и почек с нарушением функции, эпилепсия., гиперкинез, бронхиальная астма, ИБС.

## Способ применения и дозы

Сангвиритрин принимают внутрь, после еды, не разжевывая. Взрослым обычно по 2 табл. 3-4 раза в сутки (при необходимости до 9 табл./сут). Детям 11-15 лет — по 1-2 табл. 3 раза в сутки (суточная доза — до 6 табл.), 4-10 лет — по 1 табл. 3-4 раза в сутки, 1-3 года — по 1 табл. на год жизни (1 год — 1 табл./сут; 2 года — по 1 табл. 1-2 раза в сутки; 3 года — по 1 табл. 2-3 раза в сутки и т.д.).

## Побочные действия

Аллергические реакции, тошнота, рвота, абдоминальные боли. Указанные явления исчезают с прекращением приема.

## Передозировка

При передозировке могут усиливаться нежелательные побочные реакции, а также появиться головокружение, головная боль. Пациенту промывают желудок. Лечение симптоматическое.

## Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре 4-10 °С.

## Срок годности

3 года.