

# Тималин

## Тималин

### Состав и форма выпуска:

#### **Лиофилизированный стерильный порошок для инъекций:**

1 флакон *Тималин* содержит комплекс полипептидных фракций, выделенных из вилочковой железы (тимуса) крупного рогатого скота, 10 мг;  
растворитель - изотонический раствор натрия хлорида - в ампулах по 2 мл;  
5 или 10 флаконов в комплекте с NaCl в упаковке.



### Фармакологические свойства

Тималин - иммуномодулятор; обладает способностью стимулировать иммунологическую реактивность организма: регулирует количество Т- и В-лимфоцитов, стимулирует реакцию клеточного иммунитета; усиливает фагоцитоз. Стимулирует также процессы регенерации и кроветворения в случаях их угнетения.

### Тималин, показания к применению

Применяют у взрослых и детей в качестве иммуностимулятора и биостимулятора в комплексной терапии заболеваний, сопровождающихся понижением клеточного иммунитета, в том числе при острых и хронических гнойных процессах и воспалительных заболеваниях, при ожоговой болезни, трофических язвах и др., а также при угнетении иммунитета и кроветворной функции после лучевой или химиотерапии у онкологических больных и при других патологических процессах.

Препарат используют также для профилактики инфекционных осложнений, угнетения иммунитета и кроветворения, процессов регенерации в посттравматическом и послеоперационном периодах, при проведении лучевой и химиотерапии онкологических заболеваний.

Имеются данные об эффективности тималина в комплексной терапии рожистой инфекции, хронического пиелонефрита, химиотерапии туберкулеза легких и других заболеваний.

### Способ применения и дозы

Вводят тималин глубоко в мышцы (избегая попадания в кровеносные сосуды).

Для инъекции разводят содержимое флакона в 1 - 2 мл изотонического раствора Натрия хлорида и перемешивают содержимое легким встряхиванием, не допуская образования пены, до получения равномерной взвеси.

Вводят *взрослым* по 5 - 20 мг ежедневно (30 - 100 мг на курс).

*Детям до 1 года* вводят по 1 мг;

*1 - 3 лет* 1 - 2 мг,

*4 - 6 лет* 2 - 3 мг,

*7 - 14 лет* 3 - 5 мг.

Длительность курса 3 - 10 дней, в зависимости от выраженности нарушений иммунитета.

При необходимости проводят повторный курс (через 1 - 6 мес).

С профилактической целью вводят внутримышечно ежедневно *взрослым* по 5 - 10 мг, *детям* - по 1 - 5 мг в течение 3 - 5 дней.

### Противопоказания

Гиперчувствительность.

**Побочные действия**

Возможны аллергические реакции.

**Условия хранения:**

Список Б. В сухом, защищенном от света месте, при комнатной температуре.

**Срок годности:** 3 года.