

Фуцидин

Форма выпуска

Мазь и крем

Состав

1 г мази содержит натрия фузидат 20 мг, вспомогательные вещества: ланолин; спирт цетиловый; парафин жидкий; парафин белый мягкий.

1 г крема содержит фузидовая кислота безводная 20 мг, вспомогательные вещества: бутилгидроксианизол; спирт цетиловый; глицерол 85%; парафин жидкий; калия сорбат; полисорбат 60; парафин белый мягкий; вода очищенная.

Упаковка

в тубах по 15 г

Фармакологическое действие

Фуцидин оказывает антибактериальное действие.

Фуцидин, показания к применению

Бактериальные кожные инфекции у взрослых, подростков, детей и новорожденных.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому компоненту Фуцидина.

Применение при беременности и кормлении грудью

Фуцидин следует применять с осторожностью в период беременности и грудного вскармливания, хотя экспериментальные данные не подтверждают эмбриотоксическое или тератогенное действие препарата.

Способ применения и дозы

Фуцидин применяют местно. Мазь или крем наносят на участок поражения кожи 3 раза в день в течение 10 дней.

Побочные действия

Частота побочных эффектов относится к категории очень редкой и составляет приблизительно 2:1000000 курсов лечения.

Кожа и подкожные ткани (перечислены в порядке убывания частоты): зуд, раздражение, ощущение жжения и покалывания, сухость кожи, сыпь (эритематозная, макулопапулезная, пустулезная), контактный дерматит, экзема, эритема, крапивница, ангионевротический отек, периорбитальный отек.

Иммунная система: аллергические реакции.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Срок годности

3 года.

