

Фуцидин Г крем 2%

Латинское название

Fucidin H

Форма выпуска

Крем для наружного применения

Состав

15 г крема для наружного применения содержат: фузидовой кислоты полугидрат (в пересчете на кислоту безводную) - 20 мг, гидрокортизона ацетат - 10 мг.

Вспомогательные вещества:

бутилгидроксианизол, спирт цетиловый, глицерол 85%, парафин жидкий, калия сорбат, полисорбат 60, парафин белый мягкий, хлористоводородная кислота 3 М, вода очищенная.

Упаковка

В тубе алюминиевой 15 г крема. В упаковке 1 туба.

Фармакологическое действие

Фуцидин Г - комбинированный препарат для наружного применения. Объединяет противовоспалительное и противозудное действие гидрокортизона с антибактериальным действием фузидовой кислоты. Высоко активен в отношении: *Staphylococcus* spp, особенно *Staphylococcus aureus* и *Staphylococcus epidermidis* (включая метициллин-резистентные штаммы); *Streptococcus* spp, *Neisseria* spp, *Clostridium* spp, *Nocardia asteroides*, *Enterococcus* spp, *Bacteroides* spp, *Mycobacterium tuberculosis*, *Mycobacterium leprae*, *Corynebacterium minutissimum*. Антибактериальная активность фузидовой кислоты не снижается в присутствии гидрокортизона.

Показания

Дерматиты при наличии бактериальной инфекции или подозрении на нее:

- Атопический дерматит.
- Себорейный дерматит.
- Простой контактный дерматит.
- Аллергический дерматит.
- Экзема.
- Хронический лишай.
- Красная дискоидная волчанка.

Противопоказания

- Гиперчувствительность к компонентам препарата.
- Туберкулез кожи.
- Кожные проявления сифилиса.
- Ветряная оспа.
- Вирусные и грибковые инфекции кожи.
- Кожные поствакцинальные реакции.
- Открытые раны.
- Трофические язвы.
- Розацеа.



- Вульгарные угри.

Применение при беременности и кормлении грудью

Экспериментальные исследования показали, что Фуцидин Г не обладает эмбриотоксическим и тератогенным действием. При наружном применении Фуцидина Г выделение как фузидовой кислоты, так и гидрокортизона с грудным молоком маловероятно из-за низкой системной адсорбции. Поскольку исследование у женщин при беременности и в период лактации не проводилось, в период беременности препарат не следует использовать длительное время и в больших количествах, при грудном вскармливании - не следует наносить препарат на молочные железы.

Способ применения и дозы

Крем Фуцидин Г наносят на пораженный участок кожи тонким слоем 2 раза в день. Курс лечения - 2 недели.

Особые указания

Следует избегать длительного применения препарата, особенно на лице и складках кожи, а также у детей. Избегать попадания препарата в глаза.

Передозировка

Симптомы: превышение рекомендованных доз, длительное применение местных глюкокортикостероидов на обширных поверхностях может привести к подавлению функции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы и развитию симптомов гиперкортицизма.

Лечение: рекомендуется постепенная отмена препарата, симптоматическая терапия, при необходимости проводят коррекцию электролитного баланса.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C.

Срок годности

3 года.