

# Таривид

## Форма выпуска

Таблетки, покрытые оболочкой

## Состав

1 табл. содержит офлоксацина 200 мг

## Упаковка

в упаковке 10 или 40 шт

## Фармакологическое действие

Таривид оказывает антибактериальное, бактерицидное действие. Блокирует ДНК-гиразу, прекращает репликацию ДНК в микробной клетке.

## Таривид, показания к применению

Инфекции дыхательных путей, ЛОР-органов, кожи и мягких тканей, брюшной полости (включая малый таз), почек и мочевыводящих путей, инфекции в акушерстве и гинекологии, гонорея.

## Противопоказания

Гиперчувствительность, эпилепсия, возраст (до 18 лет), заболевания ЦНС с пониженным судорожным порогом.

## Применение при беременности и кормлении грудью

Применение Таривида противопоказано.

## Способ применения и дозы

Таривид принимают внутрь, независимо от приема пищи, по 1 табл. (200 мг) 2 раза в день, курс — 7-10 дней (не рекомендуется принимать в течение более 8 нед). При гонорее — 2 табл. однократно. Максимальная суточная доза — 0,8 г.

## Побочные действия

Диспепсия, головная боль, головокружение, нарушение сна, беспокойство, снижение реакции, повышение уровня билирубина и активности ферментов печени, фотосенсибилизация, аллергические реакции (кожная сыпь, отек лица и голосовых связок, удушье, шок).

## Особые указания

Следует учитывать возможное снижение скорости реакции (Таривид осторожно назначать при управлении транспортными средствами).

## Условия хранения

В защищенном от света и влаги месте, при температуре не выше 25 °С.

