

Для лечения цитомегаловирусной инфекции.

В составе комплексной терапии аллергических и вирусных энцефаломиелитов (в т.ч. рассеянный склероз, лейкоэнцефалиты, увеоэнцефалиты).

В составе комплексной терапии урогенитального и респираторного хламидиоза.

В составе комплексной терапии туберкулеза легких.

Для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ.

У детей старше 7 лет

Для лечения гриппа и ОРВИ.

Противопоказания

Беременность.

Период лактации (грудного вскармливания).

Детский возраст до 7 лет.

Повышенная чувствительность к препарату.

Применение при беременности и кормлении грудью

Амиксин противопоказан к применению при беременности и в период лактации.

Способ применения и дозы

Препарат принимают внутрь после еды.

Назначение детям старше 7 лет при неосложненных формах гриппа и других ОРВИ

Детям старше 7 лет при неосложненных формах гриппа или других ОРВИ препарат назначают в дозе 60 мг (1 таб.) 1 раз/сут после еды на 1-й, 2-й и 4-й день от начала лечения. Курсовая доза - 0.18 г (3 таб.).

Развитие осложнений гриппа и других ОРВИ.

При развитии осложнений гриппа и других ОРВИ препарат принимают по 60 мг 1 раз/сут на 1-й, 2-й, 4-й, 6-й день от начала лечения. Курсовая доза - 0.24 г (4 таб.).

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы: Возможны симптомы диспепсии.

Прочие: Возможны кратковременный озноб. Аллергические реакции.

Лекарственное взаимодействие

Амиксин совместим с антибиотиками и средствами традиционного лечения вирусных и бактериальных инфекций.

Передозировка

До настоящего времени случаи передозировки препарата Амиксин неизвестны.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 30°C.

Срок годности

3 года.