Полижинакс

Форма выпуска
Капсулы вагинальные

Состав
1 капсула содержит:
неомицина сульфат - 35 тыс. МЕ;
полимиксина В сульфат - 35 тыс. МЕ;
нистатин - 100 тыс. МЕ;
вспомогательные вещества: гидрогенизированное соевое масло, Тефоз 63, диметикон 1000;
Состав оболочки: желатин, глицерол, диметикон 1000, вода очищенная.

Упаковка
6 шт.

Фармакологическое действие
Полижинакс - противомикробный препарат для местного применения в гинекологии. Оказывает бактерицидное действие. *Активен в отношении грамположительных микроорганизмов:* Staphylococcus aureus, Corynebacterium spp.; *грамотрицательных микроорганизмов:* Enterococcus faecium, Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Proteus vulgaris, Klebsiella pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis, Pseudomonas aeruginosa, Ureaplasma urealyticum. Оказывает фунгицидное действие на *патогенные грибы*, особенно дрожжеподобные грибы рода Candida albicans, Cryptococcus, Hystoplasma. Улучшает трофические процессы в слизистой оболочке влагалища.

Показания
Лечение инфекционно-воспалительных заболеваний, вызванных чувствительными микрооорганизмами:
– неспецифические вагиниты;
– грибковые вагиниты;
– смешанные вагиниты;
– вульвовагиниты;
– цервиковагиниты.
Профилактика инфекционно-воспалительных заболеваний:
– перед хирургическим вмешательством в области половых органов;
– до и после диатермокоагуляции шейки матки;
– перед внутриматочными диагностическими процедурами;
– перед родами.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью
Пациентка должна быть проинформирована, что не рекомендуется применение препарата при беременности без консультации врача.
Следует избегать применения препарата в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы
Одну капсулу Полижинакс вводят глубоко во влагалище вечером перед сном.
Курс лечения - 12 дней. Профилактический курс - 6 дней. В случае пропуска одной или нескольких доз следует возобновить лечение в обычной дозе.

Побочные действия
Возможны: аллергические реакции. При длительном применении возможно системное проявление побочных действий аминогликозидов.

Особые указания
Сроки применения препарата должны быть ограничены с целью предупреждения формирования устойчивости к нему отдельных возбудителей заболеваний и риска реинфекции.
При длительном применении возможно системное проявление побочных действий аминогликозидов, усиливающееся при почечной недостаточности.
Во время лечения не рекомендуется использовать колпачки и презервативы из латекса.
Не следует прерывать курс лечения во время менструации.
Пациент должен быть информирован, что в случае развития почечной недостаточности следует обратиться к врачу.

Лекарственное взаимодействие
Не рекомендуется использовать в сочетании со спермицидами, т.к. возможно снижение активности препарата.

Условия хранения
Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.

Срок годности
2 года.