# Бепантен плюс

# Форма выпуска

крем для наружного применения

#### Состав

1 г крема содержит декспантенол - 50мг хлоргексидина гидрохлорид - 5 мг; вспомогательные вещества: D,L-пантолактон, цетиловый спирт, стеариловый спирт, ланолин, парафин белый мягкий, парафин жидкий, полиоксил 40 стеарат, вода очищенная.



#### **Упаковка**

туба 30 г.

# Фармакологическое действие

Бепантен плюс - препарат для наружного применения с противомикробным, противовоспалительным и улучшающим регенерацию тканей действием.

*Хлоргексидин* - антисептик, который активен против бактерий, имеющихся обычно на коже или попавших на кожу в результате загрязнения раны.

*Декспантенол* в клетках кожи быстро превращается в пантотеновую кислоту, которая играет важную роль как в формировании, так и в заживлении поврежденных кожных покровов.

Препарат уменьшает боль благодаря охлаждающему действию. При нанесении на поверхность раны защищает от инфекции, способствуя заживлению.

Легко наносится и смывается. Крем нежирный и не липнет.

# Бепантен плюс, показания к применению

- небольшие раны с угрозой инфицирования (ссадины, царапины, небольшие порезы и расчесы, трещины, легкие ожоги);
- инфицированные поверхностные поражения кожи;
- трещины сосков в период грудного вскармливания;
- хронические раны (например, трофические язвы голени, пролежни);
- операционные раны.

### Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Не предназначен для обработки или лечения ушной раковины.

В случае тяжелых, глубоких и сильно загрязненных ран (такие повреждения требуют врачебного вмешательства).

#### Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат можно использовать при беременности и в период грудного вскармливания, однако следует избегать его применения на больших поверхностях кожи.

# Способ применения и дозы

Крем Бепантен плюс наносят тонким слоем один или несколько раз в день на предварительно очищенную раневую поверхность или на воспаленные участки кожи.

Лечение ран может проводиться как открытым способом, так и с использованием повязок.

# Побочные действия

Аллергические реакции: возможны крапивница, зуд.

## Особые указания

Следует избегать попадания крема в глаза. Нельзя принимать внутрь.

Большие по площади, сильно загрязненные и глубокие раны, а также укушенные и колотые раны требуют врачебного вмешательства (из-за риска развития столбняка).

Если размеры раны в течение некоторого времени остаются неизменно большими или рана не заживает в течение 10-14 дней, то необходима консультация врача. Это необходимо и в случае, если края раны сильно гиперемированы, рана неожиданно отекает и появляются сильные боли или повреждение сопровождается лихорадкой (из-за опасности развития сепсиса).

# Лекарственное взаимодействие

В качестве меры предосторожности относительно возможного взаимодействия (антагонизм или инактивация), не следует применять Бепантен плюс одновременно с другими антисептиками.

# Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

# Срок годности

3 года.