

# Далацин

## Латинское название

Dalacin

## Форма выпуска

Суппозитории вагинальные

## Состав

1 суппозиторий содержит клиндамицин (в форме фосфата) 100 мг;

*вспомогательные вещества*: твердый жир (Witepsol H-32, смесь триглицеридов, диглицеридов и моноглицеридов).

## Упаковка

3 шт.

## Фармакологическое действие

Далацин - антибиотик группы линкозамидов для местного применения. Механизм действия связан с подавлением синтеза белка в микробной клетке за счет взаимодействия с 50S-субъединицей рибосом. Оказывает бактериостатическое действие; в более высоких концентрациях в отношении некоторых микроорганизмов - бактерицидное. Препарат активен в отношении микроорганизмов, вызывающих бактериальные вагинозы: *Gardnerella vaginalis*, *Mobiluncus* spp., *Mycoplasma hominis*, *Peptostreptococcus* spp., *Bacteroides* spp.

## Показания

Бактериальный вагиноз.

## Противопоказания

Повышенная чувствительность к клиндамицину, линкомицину или любому компоненту препарата Далацин.

## Применение при беременности и кормлении грудью

Адекватных и контролируемых исследований по применению препарата в I триместре беременности не проводилось. Применение Далацина в I триместре беременности возможно только в том случае, если предполагаемая польза превосходит потенциальный риск для плода.

При применении препаратов клиндамицина во II и III триместрах беременности в лекарственных формах для интравагинального введения не отмечалось увеличения частоты врожденных аномалий плода. Если Далацин применяется во II и III триместрах беременности (хотя официальных исследований по применению суппозитория при беременности не проводилось), то неблагоприятное влияние на плод представляется маловероятным.


В настоящее время отсутствуют данные о выведении клиндамицина с грудным молоком при интравагинальном применении Далацина. Однако установлено, что при введении клиндамицина внутрь или парентерально некоторое его количество обнаруживается в грудном молоке. Поэтому при решении вопроса о возможности назначения Далацина в период лактации (грудного вскармливания) следует сопоставить ожидаемую пользу для матери и возможный риск для ребенка.

## Способ применения и дозы

Разовую дозу (1 суппозиторий) вводят во влагалище перед сном в течение 3 дней подряд.

Суппозитории можно вводить без аппликатора и с аппликатором. После каждого использования аппликатор следует вымыть теплой водой с мылом и хорошо просушить.

## Побочные действия



Частота возникновения перечисленных ниже побочных эффектов - менее 10%.

*Со стороны половой системы:* раздражение слизистой оболочки вульвы и влагалища, боль во влагалище, выделения из влагалища, вагинальный кандидоз, вульвовагинит, трихомонадный вагинит, вагинальные инфекции, нарушения менструального цикла, маточное кровотечение, аномальные роды, эндометриоз.

*Со стороны мочевыделительной системы:* дизурия, инфекции мочевыводящих путей (в т.ч. пиелонефрит), протеинурия.

*Со стороны пищеварительной системы:* генерализованная боль в животе, локализованная боль в животе, спазмы в животе, вздутие живота, диспепсия, тошнота, рвота, диарея, запор, метеоризм, неприятный запах изо рта, извращение вкуса.

*Со стороны ЦНС:* головокружение, головная боль.

*Дерматологические реакции:* сыпь, зуд, макуло-папулезная сыпь, эритема, кандидоз кожи.

*Аллергические реакции:* крапивница.

*Со стороны эндокринной системы:* глюкозурия, гипертиреоз.

*Со стороны организма в целом:* грибковые инфекции, лихорадка, боль в боку, боль в спине, боль в низу живота, генерализованная боль, бактериальные инфекции, воспалительный отек, инфекции верхних дыхательных путей, носовое кровотечение, отклонение результатов микробиологических анализов от нормы.

*Местные реакции:* зуд и боль в месте введения.

### **Особые указания**

До назначения препарата с помощью специальных лабораторных методов следует исключить следующих возможных возбудителей вульвовагинита: *Trichomonas vaginalis*, *Chlamydia trachomatis*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Candida albicans* и вирус *Herpes simplex*.

Интравагинальное применение Далацина может привести к усиленному росту нечувствительных к препарату микроорганизмов, особенно дрожжеподобных грибов.

При применении препарата возможна системная абсорбция клиндамицина. При системном применении клиндамицина возможно развитие тяжелой диареи и в ряде случаев псевдомембранозного колита. В связи с этим при возникновении на фоне терапии Далацином выраженной или длительной диареи необходимо отменить препарат, провести диагностические процедуры и при необходимости назначить соответствующее лечение.

Далацин в форме вагинальных суппозиториях и вагинального крема содержит компоненты, которые могут уменьшать прочность изделий из латекса или каучука (презервативы, противозачаточные вагинальные диафрагмы). Поэтому использование подобных изделий во время лечения Далацином в форме вагинальных суппозиториях и вагинального крема не рекомендуется.

### **Лекарственное взаимодействие**

В условиях *in vitro* продемонстрировано антагонистическое взаимодействие между клиндамицином и эритромицином .

Установлено, что при системном применении клиндамицин нарушает нервно-мышечную передачу, поэтому возможно усиление действия миорелаксантов периферического действия. Этот факт следует учитывать при необходимости назначения последних с Далацином.

В фармакодинамических, фармакокинетических или клинических исследованиях данных лекарственных форм никаких взаимодействий не наблюдалось.

### **Условия хранения**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Не замораживать.

### **Срок годности**

3 года.