

Граммидин нео

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания

Состав

1 таблетка содержит:

активные вещества: грамицидина С дигидрохлорида (в пересчете на грамицидин С) - 0,003 г, цетилпиридиния хлорида моногидрата (в пересчете на цетилпиридиния хлорид) - 0,001 г
вспомогательные вещества: кремния диоксид коллоидный (Аэросил 200), тальк, ацесульфам калия, ароматизатор мятный, сорбитол (Neosorb), магния стеарат.

Упаковка

18 шт.

Фармакологическое действие

Граммидин Нео - комбинированный препарат для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний горла и полости рта. В состав препарата входит противомикробное средство грамицидин С и антисептическое средство - цетилпиридиния хлорид.

Механизм действия грамицидина С связан с повышением проницаемости цитоплазматической мембраны микробной клетки, что нарушает ее устойчивость и вызывает гибель клетки. Грамицидин С оказывает выраженное противомикробное действие в отношении возбудителей инфекционных заболеваний полости рта и глотки.

Цетилпиридиния хлорид относится к антисептическим средствам. Подавляет рост и размножение возбудителей инфекционных заболеваний полости рта.

Препарат уменьшает воспаление, оказывает противомикробное действие, смягчает неприятные ощущения в горле, облегчает глотание, при рассасывании вызывает гиперсаливацию, что способствует механическому очищению полости рта и глотки от микроорганизмов.

Показания

Инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и горла: ангина, фарингит, тонзиллит, пародонтит, гингивит, стоматит.



Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, период лактации.

С осторожностью применять при беременности.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не рекомендуется применять препарат при беременности (I) триместр.

Грудное вскармливание на время приема препарата необходимо прекратить.

Способ применения и дозы

Применяется после еды, путем рассасывания во рту не разжевывая.

Непосредственно после применения препарата следует воздержаться от приема пищи и напитков в течение 1 -2 часов.

Дозировка для взрослых и детей старше 12 лет: по 1 таблетке 3 - 4 раза в день.

Дозировка для детей от 4 до 12 лет: по 1 таблетке 1 -2 раза в день.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 7 дней приема препарата рекомендуется обращение к врачу.

Побочные действия

В отдельных случаях возможны аллергические реакции на компоненты препарата.

Лекарственное взаимодействие

Граммидин нео усиливает эффекты других противомикробных средств местного и системного действия.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°C.

Срок годности

2 года.