Изотрексин

Форма выпуска
Гель для наружного применения.

Состав
1 г геля содержит изотретиноин 500 мкг, эритромицин 20 мг

Упаковка
туба по 6 г, 25 г, 30 г, 40 г или 50 г.

Фармакологическое действие
Изотрексин - комбинированный препарат для лечения угревой сыпи.

Изотретиноин - одна из биологически активных форм витамина А, оказывает регулирующее воздействие на рост клеток эпителия, их дифференциацию. Тормозит терминальную дифференцировку себоцитов и гиперпролиферацию эпителия выводных протоков сальных желез, нормализует состав их секрета и облегчает его эвакуацию. За счет этого уменьшается выработка кожного сала и снижается воспалительная реакция вокруг желез. Изотретиноин воздействует на комедоногенез, тормозит фолликулярную кератинизацию, подавляет угри, вызванные Propionebacterium acnes. Оказывает антисеборейное, противовоспалительное, кератолитическое действие.

Эритромицин - антибиотик группы макролидов, оказывает ингибирующее действие на синтез белка в бактериях путем обратимого связывания рибосомальных подгрупп. При лечении угрей эффективность эритромицина проявляется в снижении популяции Propionebacterium acnes.

Изотретиноин как компонент Изотрексина эффективен при комедональной фазе заболевания, в то время как эритромицин эффективен при лечении воспаленной угревой сыпи слабой или умеренной степени выраженности.

Показания
— лечение угревой сыпи слабой или средней степени выраженности.

Противопоказания
— детский возраст до 12 лет;

— беременность;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью
Применение Изотрексина при планируемой и установленной беременности противопоказано. Чрескожная абсорбция изотретиноина незначительна. Тем не менее, поскольку неизвестно, выделяются ли компоненты

препарата с грудным молоком, Изотрексин не следует назначать в период лактации (грудного вскармливания).

Способ применения и дозы
Изотрексин применяют наружно. Гель наносят тонким слоем на пораженный участок кожи 2 раза/сут. (утром до нанесения макияжа и вечером после умывания).

Побочные действия
Дерматологические реакции: ощущения незначительного покалывания, жжения и раздражения, эритема и шелушение кожи в месте нанесения Изотрексина, фотосенсибилизация.

Условия хранения
Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 20°С.

Срок годности
2 года.