# Клиндовит

**Форма выпуска**
Гель.

**Состав**
В 1 г геля для наружного применения содержится: Клиндамицин (в форме фосфата) 10 мг

Вспомогательные вещества: Метилпарагидроксибензоат (нипагин), аллантоин, токоферола фосфата лаурилиминодипропионат динатрия, пропиленгликоль, макрогол 400 (полиэтиленоксид 400), карбомер (сополимер, интерполимер), натрия гидроксид, вода очищенная

**Упаковка**
В тубе 30 г геля. В картонной коробке 1 туба.

**Фармакологическое действие**
Гель Клиндовит 1% - антибиотик из группы линкозамидов.

- Активен в отношении:
- Всех штаммов Propionibacterium acnes.

МПК - 0.4 мкг/мл.

Ингибирует синтез белка в микробной клетке за счет взаимодействия с 50S-субъединицами рибосом.

Клиндамицина фосфат не активен in vitro, но после нанесения на кожу быстро гидролизуется фосфатазами в протоках сальных желез с образованием клиндамицина, обладающего антибактериальной активностью. После нанесения на кожу количество свободных жирных кислот на поверхности кожи уменьшается примерно с 14% до 2%.

**Клиндовит, показания к применению**
Лечение угревой сыпи (acne vulgaris).

**Противопоказания**
- Болезнь Крона.
- Язвенный колит (в т.ч. в анамнезе).
- Псевдомембранозный колит (в т.ч. в анамнезе).
- Повышенная чувствительность к клиндамицину или линкомицину .

С осторожностью:

- У пациентов в возрасте до 12 лет (данные по безопасности и эффективности отсутствуют).
- В период лактации (грудного вскармливания).
- У пациентов, предрасположенных к развитию аллергических реакций.
- При одновременном приеме миорелаксантов.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Клиндовит можно применять наружно при беременности, если предполагаемая польза терапии для матери превышает потенциальный риск для плода.

При необходимости применения в период лактации грудное вскармливание рекомендуется прекратить.

**Способ применения и дозы**
Препарат применяют наружно.

Гель наносят тонким слоем на пораженную часть предварительно очищенной и высушенной кожи 2-3 раза/сут.

Для получения терапевтического эффекта лечение следует продолжать в течение 6-8 недель, а при необходимости можно продолжить до 6 месяцев.

**Побочные действия**
Препарат обычно хорошо переносится.

- Местные реакции: Возможно раздражение (в месте нанесения), жжение, зуд, сухость кожи, эритема, шелушение, повышенное выделение кожного сала, контактный дерматит.

- Системные реакции: Псевдомембранозный энтероколит (вероятность развития имееется при системной абсорбции клиндамицина).

**Особые указания**
При применении следует избегать контакта препарата с глазами и полостью рта, а после нанесения геля необходимо вымыть руки.

**Лекарственное взаимодействие**
Клиндамицин и эритромицин являются антагонистами, поэтому не рекомендуется одновременное назначение этих антибиотиков.

Существует перекрестная резистентность между клиндамицином и линкомицином .

Клиндамицин может усиливать действие миорелаксантов, нарушая нервно-мышечную передачу.

**Условия хранения**
Хранить при температуре от 15° до 25°С.

**Срок годности**
2 года.