

Эктерицид

Эктерицид/Ectericidum

Состав и форма выпуска

Эктерицид раствор для наружного применения

Препарат, получаемый из рыбьего жира. Содержит альдегиды, жирные кислоты и перекиси.

Во флаконах по 250 мл.

Фармакологическое действие

Эктерицид - антибактериальный (приводящий к гибели бактерий) препарат. Активен в отношении пиогенной (гноеродной) микрофлоры (протей, стафилококки, синегнойная и кишечные палочки).

Эктерицид, показания к применению

Раны, осложненные пиогенной флорой, фурункулы (воспаление волосяного мешочка кожи, распространившееся на окружающие ткани), карбункулы (острое разлитое гнойно-некротическое воспаление нескольких расположенных рядом сальных желез и волосяных луковиц), ожоги, нагноившиеся трофические язвы (длительно не заживающие дефекты кожи); для санации (обработки) носителей менингококка.

Противопоказания

Не установлены.

Способ применения

Наружно (орошения раневой поверхности, повязки). Повязки меняют через 3-4 дня; при ожогах препарат применяют с 0,5% раствором новокаина (10 мл новокаина на 50 мл эктерицида). Для санации носителей менингококка орошают носоглотку (25-30 мл препарата), закапывают в нос по 4-5 капель и закладывают турунды (узкие марлевые тампоны) в каждую половину носа на 20-25 мин; санацию проводят под бактериологическим контролем.

Побочные действия

Не выявлено.

Особое указание

Перед использованием препарата Эктерицид вы должны проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

При температуре от +4 до +10 °С.