

Элекасол

Латинское название

Aeilecasol

Форма выпуска

Сбор растительный - сырье измельченное

Состав

солодки корни 20%, шалфея листья 20%, ромашки цветки 10%, эвкалипта листья 20%, календулы цветки 20%, череды трехраздельной трава 10%

Упаковка

Пачка 50 г.

Фармакологическое действие

Отвар сбора Элекасол обладает антимикробной активностью в отношении стафилококка, кишечной палочки, синегнойной палочки, протей и некоторых других микроорганизмов; оказывает противовоспалительное действие и стимулирует репаративные процессы.

Показания

Применяется как антимикробное и противовоспалительное средство в составе комплексной терапии:

- заболеваний дыхательных путей и ЛОР-органо: в хронический тонзиллит, острый ларингофарингит, острый и хронический фарингит, трахеит, бронхит,
- в стоматологии: острый и рецидивирующий афтозный стоматит, красный плоский лишай слизистой оболочки полости рта, пародонтит,
- в гастроэнтерологии: хронический гастродуоденит, энтерит, колит, энтероколит,
- в дерматологии: микробная экзема, нейродермит, розовые угри, вульгарные угри,
- в гинекологии: неспецифические воспалительные заболевания влагалища и шейки матки (кольпит, цервицит),
- в урологии: хронический пиелонефрит, хронический цистит, уретрит, хронический простатит.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам Элекасол.

Способ применения и дозы

Элекасол применяют в виде свежеприготовленного отвара внутрь, наружно или местно (в том числе ингаляционно).

Около 8 г (2 столовые ложки) сбора помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипятка, настаивают 1 час, кипятят на слабом огне 15 минут, повторно настаивают при комнатной температуре 45 минут и процеживают без добавления дополнительного количества воды.

Для приема внутрь используют по 1/3 стакана отвара 3 раза в день за 30 минут до еды в неразбавленном или разбавленном (в 2-4 раза) виде.

Наружно холодный отвар Элекасолол используют в неразбавленном виде для примочек 1-2 раза в сутки.

Для ингаляций применяют отвар в горячем (теплом) неразбавленном виде, в том числе при проведении



процедур на ультразвуковом ингалятором.

Для *полосканий*, орошений и спринцеваний отвар разбавляют в 2–4 раза.

Для *микрорелизм* используют по 50 мл неразбавленного теплого отвара.

Побочные действия

Аллергические реакции.

Особые указания

Для проведения ингаляций (в том числе с использованием ультразвукового ингалятора) следует использовать только теплый или горячий отвар Элекасола (при использовании холодного отвара возможно развитие бронхоспазма!).

Условия хранения

Хранить в сухом, проветриваемом, защищенном от света месте.

Срок годности

2 года