

Гексикон

Форма выпуска

Препарат выпускается в двух формах:

- суппозитории вагинальные белого или белого с желтоватым оттенком цвета, торпедообразной формы, допускается мраморность поверхности;
- раствор, предназначенный для наружного применения.

Состав

1 суппозиторий содержит 16 мг хлоргексидина биглюконата;

основа: полиэтиленоксид 1500, полиэтиленоксид 400 — достаточное количество до получения суппозитория массой от 2,94 до 3,25 г;

Активное вещество: хлоргексидина биглюконат (0,25 мг 20-процентного раствора на 100 мл препарата и 8 мг на 1 вагинальный суппозиторий).

Вспомогательные вещества: вода очищенная (раствор), полиэтиленоксидная основа, состоящая из полиэтиленоксида 1500 и полиэтиленоксида 400 (суппозитории).

Упаковка

Раствор — флакон 100 мг.

Суппозитории — в упаковке 10 шт. по 16 мг.

Фармакологическое действие

Гексикон представляет собой антисептический препарат местного интравагинального применения.

Проявляет активность в отношении ряда микроорганизмов:

- грамотрицательных и грамположительных бактерий: *Treponemapallidum*, *Chlamydia* spp., *Neisseriagonorrhoeae*, *Ureaplasma* spp, *Bacteroidesfragilis*, *Gardnerellavaginalis*;
- вирусов: *Herpes* simplex 1-го и 2-го типов;
- простейших: *Trichomonasvaginalis*.

Гексикон не оказывает отрицательного воздействия на лактобациллы. Активность препарата сохраняется (хотя и пониженная) в присутствии гноя или крови.

Гексикон, показания к применению

Показания для назначения Гексикона:

- лечение и профилактика венерических инфекций (включая гонорею, сифилис, уреаплазмоз, трихомониаз, хламидиоз, генитальный герпес);
- лечение уретропростатита и уретрита (при комплексной терапии);



- лечение инфекционных заболеваний кожи и слизистых оболочек (в хирургии, урологии, акушерстве и гинекологии);
- обработка инфицированных ожоговых поверхностей;
- дезинфекция гнойных ран;
- в стоматологических целях — для полоскания или орошения полости рта при гингивите, стоматите, пародонтите, афтах, альвеолите.

Противопоказания

Гексикон противопоказан при:

- дерматитах;
- аллергических реакциях;
- повышенной чувствительности к компонентам препарата.

При применении препарата для лечения детей следует соблюдать осторожность.

Применение при беременности и кормлении грудью

В форме раствора разрешается применять Гексикон при беременности и грудном вскармливании.

Способ применения и дозы

Способ применения Гексикона, его дозировка и продолжительность лечения зависят от вида заболевания.

При лечении уретрита и уретропростатита: раствор впрыскивается в уретру 1-2 раза в сутки в количестве 2-3 мл. Процедуры проводятся через день, курс лечения составляет 10 дней.

При поражениях кожных покровов и слизистых оболочек: раствор применяют 2-3 раза в сутки в виде полосканий, орошений и аппликаций с использованием тампона — на одну процедуру необходимо 5-10 мл раствора, который наносится на пораженную поверхность слизистой оболочки или кожи с экспозицией 1-3 мин.

В качестве профилактики заболеваний, передаваемых половым путем: гексикон применяется в течение 2 часов после полового акта. С помощью насадки на флаконе мужчинам необходимо вводить в количестве 2-3 мл в мочеиспускательный канал, женщинам: 1-2 мл в мочеиспускательный канал и 5-10 мл во влагалище, с задержкой на 2-3 минуты. Затем необходимо раствором обработать кожу лобка, половых органов и внутренних поверхностей бедер. После процедуры в течение 2 часов нельзя мочиться, чтобы не снижать эффект препарата.

Вагинальные суппозитории используются *при комплексном лечении молочницы и венерических заболеваний*. Свечи Гексикон вводятся глубоко во влагалище, где они начинают таять и оказывать лечебное действие. Продолжительность курса, в зависимости от заболевания, составляет 7-10 дней. Рекомендуется вводить свечи на ночь, перед сном. В случае, если препарат применяется дважды в день, при дневном введении следует в течение часа полежать. При наличии соответствующих показаний препарат может использоваться для лечения беременных и кормящих женщин.

Побочные действия

Побочное действие препарата может проявляться в различных формах:

При наружном применении: в виде аллергических реакций, зуда, дерматита, сухости кожи, липкости кожи рук, фотосенсибилизации;

При интравагинальном применении: в виде аллергических реакций и зуда, проходящих после отмены препарата;

При лечении гингивита: отложение зубного камня, окрашивание эмали зубов, нарушение вкуса.

Особые указания

При наружном применении препарата следует избегать его попадания на внутренние поверхности ран у пациентов с повреждениями спинного мозга, открытой черепно-мозговой травмой и перфорацией барабанной перепонки. При случайном попадании препарата на слизистую оболочку глаз, их нужно тщательно промыть водой.

Следует избегать попадания препарата на ткани — если они ранее находились в контакте с веществами, содержащими хлоргексидин, то на них могут возникнуть коричневые пятна.

С повышением температуры происходит усиление бактерицидного действия препарата, а при температуре более 100°C происходит его частичное разложение.

Лекарственное взаимодействие

Не рекомендуется применять Гексикон одновременно с йодом.

Препарат несовместим с содержащими анионную группу детергентами, включая натрия лаурилсульфат, сапонины и натрия карбоксиметилцеллюлозу. Мыло обладает способностью инактивировать хлоргексидин, потому перед применением препарата следует тщательно смыть остатки мыла.

Эффективность препарата усиливается при взаимодействии с этанолом.

Передозировка

Случаи передозировки Гексиконом неизвестны.

Условия хранения

- Гексикон необходимо хранить при температуре до 25°C в защищенном от света месте.
- Хранить в местах недоступных для детей.

Срок годности

Препарат годен в течение 2 лет.

Дополнительное поле

Гексикон — препарат, обладающий широким противомикробным эффектом, способный подавлять патологические микроорганизмы при сохранении нормальной микрофлоры влагалища. Не приводит к увеличению количества вагинальных выделений, в период лечения не требует использования дополнительных гигиенических средств.

Изготовлен на водорастворимой ПЭО-основе, может использоваться при беременности и лактации.

Отпуск из аптек

Рецепт врача не требуется. Цена Гексикона зависит от формы выпуска и производителя.