

# Гексорал

## Латинское название

Hexoral

## Форма выпуска

Аэрозоль для местного применения

## Состав

100 мл средства содержат:

*Активное вещество:* гексэтидин - 200 мг.

*Вспомогательные вещества:* полисорбат 80, лимонной кислоты моногидрат, натрия сахаринат, левоментол, масло листьев эвкалипта прутовидного, натрия кальция эдетат, этанол 96%, натрия гидроксид, вода очищенная, азот.

## Упаковка

Баллон аэрозольный 40 мл.

## Фармакологическое действие

Гексорал - антисептическое средство.

Противомикробное действие препарата Гексорал® связано с подавлением окислительных реакций метаболизма бактерий (антагонист тиамин). Препарат обладает широким спектром антибактериального и противогрибкового действия, в частности в отношении грамположительных бактерий и грибов рода *Candida*, однако Гексорал® может также оказывать эффект при лечении инфекций, вызванных, например, *Pseudomonas aeruginosa* или *Proteus*. В концентрации 100 мг/мл препарат подавляет большинство штаммов бактерий. Развитие устойчивости не наблюдалось. Гексэтидин оказывает слабое анестезирующее действие на слизистую оболочку.

## Показания

- Воспалительные и инфекционные заболевания полости рта и глотки.
- При комплексном лечении тяжелых лихорадочных или гнойных заболеваний полости рта и глотки, требующих назначения антибиотиков и сульфаниламидов, тонзиллит.
- Ангины (в т.ч. ангины с поражением боковых валиков, ангины Плаут-Винцента).
- Фарингит.
- Гингивит и кровоточивость десен.
- Периодонтопатии (заболевания периодонта и их симптомы).
- Стоматит (воспаление слизистой оболочки полости рта), глоссит (воспаление языка), афтозные язвы (болезненное воспаление с поверхностными дефектами тканей) с целью профилактики суперинфекций.
- Инфицирование альвеол (лунок зубов) после удаления зубов.
- Грибковые инфекции полости рта и глотки, особенно кандидозный стоматит (молочница).
- До и после операций в полости рта и глотки.
- Дополнительная гигиена полости рта при общих заболеваниях.
- Устранение неприятного запаха изо рта, особенно в случае разрушающихся опухолей полости рта и глотки.
- Вспомогательное средство при лечении простудных заболеваний.

## Противопоказания

Детский возраст до 3 лет; повышенная чувствительность к компонентам препарата.



## **Применение при беременности и кормлении грудью**

Беременным и кормящим женщинам следует посоветоваться с врачом перед применением препарата.

## **Способ применения и дозы**

*Взрослые и дети старше 3 лет:* применяют местно в виде распылений в полости рта и глотки. Разовую дозу вводят в течение 1-2 сек. Если не указано иное, применяют 2 раза/сут, предпочтительно утром и вечером.

Гексэтидин адгезируется на слизистой оболочке и благодаря этому дает стойкий эффект. В связи с этим препарат следует применять после еды. Гексорал® безопасен также и при более частом применении.

Длительность лечения определяется врачом.

Не применять у детей в возрасте до 3 лет.

## *Общие рекомендации по применению*

Препарат распыляют в полости рта или глотке. С помощью аэрозоля можно легко и быстро обработать пораженные участки.

Необходимо выполнить следующие действия:

1. Надеть на аэрозольный баллон насадку-распылитель.
2. Направить конец насадки-распылителя на пораженный участок полости рта или глотки.
3. Во время введения препарата флакон следует удерживать постоянно в вертикальном положении, как показано на рисунке.
4. Ввести необходимое количество препарата, надавливая на головку насадки-распылителя в течение 1-2 сек, не дышать при введении аэрозоля.

## **Побочные действия**

*В отдельных случаях:* реакции повышенной чувствительности к препарату.

*При длительном применении:* возможно нарушение вкуса.

## **Особые указания**

Специальных предписаний нет.

## *Использование в педиатрии*

У детей можно применять препарат с такого возраста, когда нет опасности неконтролируемого его проглатывания или когда они не сопротивляются постороннему предмету (насадке-распылителю) во рту при применении аэрозоля и способны задерживать дыхание при впрыскивании препарата.

## *Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Гексорал® аэрозоль не влияет на способность к управлению транспортными средствами и другим потенциально опасным видам деятельности.

## *Правила утилизации препарата*

Пациент должен быть информирован о том, что если лекарственное средство пришло в негодность или истек срок годности, то не следует выбрасывать его в сточные воды или на улицу. Необходимо поместить лекарственное средство в пакет и положить в мусорный контейнер. Эти меры помогут защитить окружающую среду.

## **Лекарственное взаимодействие**

Лекарственное взаимодействие препарата Гексорал® не описано.

## **Передозировка**

Гексэтидин в указанной дозировке нетоксичен.

*Симптомы:* проглатывание больших количеств препарата приводит к рвоте, поэтому значительного всасывания не ожидается.

*Лечение:* промывание желудка необходимо в течение 2 ч после проглатывания избыточной дозы. При любых случаях передозировки пациент должен немедленно проконсультироваться с врачом.

## **Условия хранения**

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30°C.

**Срок годности**

2 года.

Содержимое аэрозольного баллона следует использовать в течение 6 месяцев после первого применения.