# Гексорал таблетки

**Латинское название**
Hexoral

**Форма выпуска**
Таблетки для рассасывания

**Состав**
1 таблетка содержит:

*Активные вещества:* хлоргексидина дигидрохлорид - 5 мг, бензокаин - 1,5 мг.

*Вспомогательные вещества:* изомальт, масло мяты перечной, ментол, тимол, аспартам, вода очищенная.

**Упаковка**
20 шт.

**Фармакологическое действие**
Гексорал - антисептическое средство.

Противомикробное действие препарата Гексорал® связано с подавлением окислительных реакций метаболизма бактерий (антагонист тиамина). Препарат обладает широким спектром антибактериального и противогрибкового действия, в частности в отношении грамположительных бактерий и грибов рода Candida, однако Гексорал® может также оказывать эффект при лечении инфекций, вызванных, например, Pseudomonas aeruginosa или Proteus. В концентрации 100 мг/мл препарат подавляет большинство штаммов бактерий. Развитие устойчивости не наблюдалось. Гексэтидин оказывает слабое анестезирующее действие на слизистую оболочку.

**Показания**
- Воспалительные и инфекционные заболевания полости рта и глотки.
- При комплексном лечении тяжелых лихорадочных или гнойных заболеваний полости рта и глотки, требующих назначения антибиотиков и сульфаниламидов, тонзиллит.
- Ангины (в т.ч. ангины с поражением боковых валиков, ангины Плаут-Винцента).
- Фарингит.
- Гингивит и кровоточивость десен.
- Периодонтопатии (заболевания периодонта и их симптомы).
- Стоматит (воспаление слизистой оболочки полости рта), глоссит (воспаление языка), афтозные язвы (болезненное воспаление с поверхностными дефектами тканей) с целью профилактики суперинфекций.
- Инфицирование альвеол (лунок зубов) после удаления зубов.
- Грибковые инфекции полости рта и глотки, особенно кандидозный стоматит (молочница).
- До и после операций в полости рта и глотки.
- Дополнительная гигиена полости рта при общих заболеваниях.
- Устранение неприятного запаха изо рта, особенно в случае разрушающихся опухолей полости рта и глотки.
- Вспомогательное средство при лечении простудных заболеваний.

**Противопоказания**
Детский возраст до 3 лет; повышенная чувствительность к компонентам препарата.

**Применение при беременности и кормлении грудью**
Беременным и кормящим женщинам следует посоветоваться с врачом перед применением препарата.

**Способ применения и дозы**
Применяют местно. Таблетку следует медленно рассасывать во рту до полного растворения.

Препарат следует начинать применять сразу же после появления первых симптомов заболевания и продолжать прием в течение нескольких дней после исчезновения симптомов.

*Взрослые и дети старше 12 лет:* как правило, назначают по 1 таб. каждые 1-2 ч по необходимости, но не более 8 таб./сут.

*Дети в возрасте 4-12 лет:* назначают до 4 таб./сут.

Применение у детей возможно только по назначению врача.

Не применять препарат у детей в возрасте до 4 лет.

**Побочные действия**
*Местные реакции:* при длительном применении возможно кратковременное нарушение вкуса и онемение языка; также возможно обратимое изменение цвета зубов и языка.

*Аллергические реакции:* при наличии гиперчувствительности к бензокаину в редких случаях возможно развитие реакций гиперчувствительности вплоть до анафилактического шока.

*Прочие:* бензокаин может являться причиной развития метгемоглобинемии у детей.

**Особые указания**
*Информация для больных диабетом*

При необходимости применения препарата у больных сахарным диабетом следует учитывать, что содержание углеводов в 1 таблетке соответствует 0,1 ХЕ.

*Правила утилизации препарата*

Пациент должен быть информирован о том, что если лекарственное средство пришло в негодность или истек срок годности, то не следует выбрасывать его в сточные воды или на улицу. Необходимо поместить лекарственное средство в пакет и положить в мусорный контейнер. Эти меры помогут защитить окружающую среду.

**Лекарственное взаимодействие**
Бензокаин за счет образования метаболита 4-аминобензойной кислоты снижает антибактериальную активность сульфонамидов и аминосалицилатов.

Сахароза, полисорбат 80, нерастворимые соли магния, цинка и кальция уменьшают действие хлоргексидина.

**Передозировка**
При правильном применении передозировка препарата невозможна, т.к. хлоргексидин практически не всасывается в кровь, а количество всасываемого бензокаина крайне мало.

*Хлоргексидин*

Хлоргексидина гидрохлорид плохо растворим в воде, все случаи передозировки описаны только при приеме хорошо растворимого в воде хлоргексидина глюконата.

*Симптомы:* повреждения слизистой оболочки при прямом контакте с хлоргексидина глюконатом, а также систематическое обратимое увеличение концентрации печеночного фермента.

*Лечение:* специфическое лечение отсутствует.

*Бензокаин*

Передозировка возможна только при неправильном применении.

*Симптомы:* возможно токсическое влияние на ЦНС, проявляющееся вначале тремором, рвотой, судорогами, а позже - угнетением ЦНС. За счет угнетения дыхания возможна кома. Высокие токсичные концентрации вызывают брадикардию, блокаду AV-проводимости и остановку сердца. Бензокаин может вызывать метгемоглобинемию (особенно у детей), сопровождающуюся удушьем и цианозом.

*Лечение:* вызвать рвоту и промыть желудок. Возможно назначение активированного угля. При гипоксии и аноксии рекомендуется искусственное дыхание с кислородной поддержкой, при остановке сердца - массаж сердца. При судорогах назначают диазепам или быстродействующие барбитураты (противопоказано при аноксических судорогах); в особо тяжелых случаях после интубирования и искусственного дыхания применяется суксаметония хлорид. Кровообращение поддерживают введением плазмы крови или растворов электролитов. При метгемоглобинемии можно применять до 50 мл 1% раствора метиленового синего в/в.

**Условия хранения**

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.

**Срок годности**

3 года.