

Салициловая мазь

Форма выпуска

Мазь для наружного применения.

Состав

100 г мази для наружного применения содержит:
действующие вещества: кислота салициловая - 2 г,
вспомогательные вещества: вазелин до 100 г.

Упаковка

Банка 25 г.

Фармакологическое действие

Салициловая мазь оказывает кератолитическое, антисептическое, местнораздражающее, противовоспалительное действие.

Показания

Применяют у взрослых в качестве местного средства для лечения ожогов и ран.

Противопоказания

Гиперчувствительность к салициловой кислоте, детский возраст.

Способ применения и дозы

Салициловую мазь применяют местно, в виде аппликаций, наносят тонким слоем на поверхность раны и закрывают стерильной салфеткой или накладывают на рану стерильную повязку, пропитанную мазью. Перед наложением повязки рану очищают от некротических тканей, вскрывают пузыри, промывают антисептическим раствором. Смену повязки проводят 1 раз в 2-3 дня до полного очищения от гнойно-некротических масс. Расход Салициловой мази на одну повязку зависит от обширности раны и в среднем составляет 0,2 г на 1 см² раневой поверхности. Длительность курса лечения — 6-20 суток.

Побочные действия

Редко - местные, аллергические реакции в виде зуда, жжения, кожной сыпи.

Особые указания

Не следует наносить препарат на родимые пятна, бородавки в т.ч. в области гениталий или лица. При лечении детей необходимо избегать обработки нескольких участков кожи одновременно. В период беременности применение препарата для лечения мозолей и ороговелостей допустимо лишь на ограниченной поверхности (не более 5 мл). При попадании на слизистые оболочки необходимо промыть соответствующую область большим количеством воды. Необходимо учитывать, что при кожных заболеваниях, протекающих с гиперемией и воспалением (в т.ч. псориазная эритродермия) или с поверхностными мокнущими поражениями, возможно повышение всасывания салициловой кислоты.

Условия хранения

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте, при температуре не выше 20°C.

