

Азелик

Форма выпуска

Гель для наружного применения.

Состав

100 г геля содержат: азелаиновая кислота в пересчете на 100 % вещество – 15 г.

Вспомогательные вещества: Бензойная кислота 0,1 г, метилпирролидон 4 г, сквалан 1 г, пропиленгликоль 8 г, динатрия эдетат 0,1 г, натрия гидроксид 0,25 г, диметикон 1 г, макрогола цетостеарат 1,4 г, карбомер интерполимер 1,4 г, вода очищенная до 100 г.

Упаковка

Туба 30 г.



Фармакологическое действие

Азелик обладает бактериостатической активностью в отношении *Propionibacterium acne* и *Staphylococcus epidermidis*, снижает выработку жирных кислот, способствующих возникновению акне. Уменьшает образование комедонов. Влияя на процесс ороговения клеток эпидермиса, подавляет рост и активность аномальных меланоцитов, вызывающих гиперпигментацию типа мелазмы. Оказывает противовоспалительное, депигментирующее действие.

Показания

Угревая сыпь (*acne vulgaris*), розацеа. Противопоказания Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

При беременности и в период грудного вскармливания применяют только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает риск для плода и ребенка.

Способ применения и дозы

Наружно. Гель следует наносить на предварительно тщательно вымытую (водой или очищенную мягким очищающим косметическим средством) и высушенную кожу лица. Гель наносят тонким слоем на пораженные участки кожи 2 раза/сут (утром и вечером) и слегка втирают. Приблизительно 2,5 см геля достаточно для всей поверхности лица. У пациентов с *угрями обыкновенными (acne vulgaris)* выраженное улучшение обычно наблюдается через 4 недели. Для получения наилучших результатов применение препарата следует продолжить в течение нескольких месяцев.

Побочные действия

В начале лечения возможно местнораздражающее действие, гиперемия и шелушение кожи, жжение, эритема, зуд, обычно прекращающиеся в процессе лечения. Возможны аллергические реакции кожи.

Особые указания

Следует избегать попадания препарата в глаза, а также на слизистые оболочки носа, губ и рта. В случаях сильно выраженного раздражения кожи в первые недели лечения гель можно применять 1 раз/сут; также возможна кратковременная отмена препарата. После исчезновения симптомов раздражения кожи следует возобновить регулярное применение препарата в рекомендованной дозе.

Лекарственное взаимодействие

Можно применять в сочетании с другими лекарственными средствами для терапии угревой сыпи.

Передозировка

В настоящее время случаев передозировки препарата не описано.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Не замораживать.

Срок годности

2 года.