

Формидрон

Форма выпуска

раствор для наружного применения

Состав

100 г раствора для наружного применения содержит:

действующее вещество: формальдегид 10 г

Упаковка

флакон 100 мл

Фармакологическое действие

Формидрон оказывает антисептическое, дезодорирующее действие.

Показания

Формидрон назначают, как средство от потливости ног, для обработки обуви, для обработки кожи при повышенном потоотделении.

Противопоказания

- аллергия на какой либо из компонентов раствора;
- воспаления на поверхности кожи и воспалительные заболевания;
- возраст до 14 лет;
- во избежание раздражения и аллергических реакций не наносить на чувствительную кожу лица.

Применение при беременности и кормлении грудью

Нет данных.

Способ применения и дозы

Наружно, рекомендуется протирать межпальцевые складки ног небольшим количеством жидкости 1 раз в день. На участки кожи с повышенной потливостью (подошвы, ладони, межпальцевые складки) после гигиенического душа и высушивания препарат наносят на 30-40 мин. Затем препарат смывают теплой водой. На нежную чувствительную кожу (подмышечные впадины и ладони у женщин) препарат нужно наносить на срок не более 20 мин. После этого кожу следует тщательно вымыть теплой водой без моющих средств и припудрить тальком или детской присыпкой. После бритья подмышечных впадин Формидрон можно наносить не ранее, чем через сутки. Одной процедуры достаточно, чтобы снизить потливость кожи на 7-12 дней. При резко выраженной потливости процедуру проводят 2-3 дня подряд.

Побочные действия

Аллергические реакции, местные реакции. При длительном использовании - сухость кожи. В этом случае применение препарата прекращают.

Особые указания

Раствор не следует наносить на лицо и слизистые оболочки.

Лекарственное взаимодействие

Нет данных.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 20°C.

Срок годности

5 лет

