

Гаразон

ГАРАЗОН (GARASONE)

Состав и форма выпуска

Гаразон — капли глазные и ушные:

1 мл капле содержит бетаметазон (в форме натрия фосфата) 1 мг, гентамицин (в форме сульфата) 3 мг; фл.-капельн. 5 мл

Фармакологическое действие

Гаразон - комбинированный препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав. Гентамицин - антибиотик широкого спектра действия из группы аминогликозидов, действует бактерицидно. Эффективен в отношении микроорганизмов: *Staphylococcus aureus* (коагулазоположительных, коагулазоотрицательных, а также некоторых штаммов, продуцирующих пенициллиназу), *Pseudomonas aeruginosa*, индолположительных и индолотрицательных видов. Бетаметазона натрия фосфат - ГКС, оказывает местное противовоспалительное действие, подавляя клеточную и фибринозную экссудацию и нормализуя повышенную проницаемость капилляров что проявляется уменьшением местной гиперемии, отека и выпота.

Гаразон, показания к применению

- стафилококковый блефароконъюнктивит;
- кератоконъюнктивиты, вторично инфицированный конъюнктивит;
- блефарит;
- кератит;
- эписклерит;
- дакриоцистит;
- ячмень (мейбомит);
- травмы переднего отдела глаза, полученные в результате попадания инородных тел, воздействия радиационного излучения, термических и химических ожогов, а также в послеоперационный период;
- острый и хронический наружный отит, экзема наружного слухового прохода.

Противопоказания



- повышенная чувствительность к какому-либо из компонентов Гаразона;
- кератит, вызванный вирусом простого герпеса (древовидный кератит);
- вирусные заболевания роговицы и конъюнктивы (например, при ветряной оспе);
- микобактериальные или грибковые инфекции глаза или уха;
- трахома;
- состояния, сопровождающиеся истончением роговицы и склеры (например, после удаления с роговицы инородного тела);
- отсутствие или перфорация барабанной перепонки;
- детский возраст до 6 лет;
- беременность;
- период лактации (в связи с недостатком информации);

Побочное действие

После применения Гаразона возможно кратковременное появление ощущения жжения, зуда или сухости кожи в месте применения.

Нежелательные явления, связанные с воздействием ГКС на глаза, включает в себя повышение внутриглазного давления, глаукому, поражение зрительного нерва, снижение остроты и сужение полей зрения, развитие задней субкапсулярной катаракты, замедленное заживление ран, проникновение воздушных пузырьков после хирургического лечения катаракты, развитие вторичной инфекции глаз (например Herpes Zoster), острый передний увеит, перфорацию роговицы и склеры, мириаза, нарушение аккомодации и ПТОЗ.

Способ применения и дозы

Дозировка Гаразона должна быть определена для каждого больного индивидуально. Обычно закапывают 1-2 капли в конъюнктивальный мешок пораженного глаза 3-4 раза/сут.

Особые указания

Гаразон предназначен только для местного применения. Нельзя вводить субконъюнктивально или непосредственно в переднюю камеру глаза.

Условия и сроки хранения

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 15° до 25°С. Срок годности — 3 года.