

Антисептик широкого спектра действия. Присыпка используется в ветеринарной и хирургической практике. Средство содержит 98% основного компонента – трийодметана.

Лечебное действие

Под действием воздуха, света, выделений из ран трийодметан разлагается с выделением йода. Антисептик оказывает следующее действие:

- Противовоспалительное
- Противомикробное
- Рассасывающее
- Очищение раневой и ожоговой поверхности
- Анестезирующее
- Вяжущее.

Порошок "Йодоформ"



25 г во флаконе – 500 рублей

Форма выпуска – порошок лимонного цвета с резким характерным запахом. Упакован во флаконы темного стекла или в пакеты из светонепроницаемой пленки.

Применение йодоформа показано в следующих случаях: наружное лечение ран, участков эрозии тканей разной этиологии

Способ применения и дозы

Антисептик используют при лечении лимфаденита, флегмон, дерматитов в смеси с вазелином в концентрации 5–10% йодоформа.

Для обработки ожогов с бактериальным загрязнением, ран с кармашками и полостями используется раствор йодоформа. Антисептик разводят в медицинском эфире в пропорции 1 к 10. Раствор не подлежит хранению. Разводить следует в количестве, необходимом для заполнения всех свищей, полостей, кармашков.

Паста "Апексидент"



2 г в шприц-тюбике – 220 рублей

В стоматологии используется паста, содержащая йодоформ, окись цинка, глицерин, другие добавки. Например, препарат «Апексидент» состоит из 40% йодоформа, кальция гидроксида и фосфата, пастообразователя и рентгеноконтрастного вещества.

Паста в стоматологии применяется при обработке корневых каналов, формировании вторичного дентина, может использоваться как пломбировочная масса в комплексе с другими антисептиками.

Способ применения и доза

Паста в стоматологической практике вводится в обработанный и очищенный от пульпы дентальный канал зуба либо при помощи инструмента, либо непосредственно из шприц-тюбика. Время нахождения препарата в каналах зависит от диагноза пациента.

Противопоказания и меры предосторожности

Противопоказания к назначению – только индивидуальная непереносимость основного действующего вещества.

При использовании йодоформа не допускать попадания в глаза, на слизистые оболочки, не вдыхать. Не принимать вовнутрь.

При одновременном использовании с другими антисептиками йодоформ усиливает действие последних.

Йодоформ при беременности

Во время беременности и периода лактации антисептик разрешен для наружной обработки ран.

Побочные эффекты

При наружном использовании йодоформа риск развития общесистемных побочных минимален. При гиперчувствительности может наблюдаться:

- Зуд в обработанной области
- Сыпь, крапивница
- Анафилаксия.

Крайне редко развиваются воспалительные процессы в слюнных железах, гайморовых пазухах, носоглотке. Это явление получило название йодизм.

Больные отмечали следующие симптомы:

- Гиперсаливация – избыточное слюноотделение
- Ринорея – выделения из носа
- Фарингиты, ларингиты, бронхиты
- Отек гортани
- Нарушение работы ЖКТ
- Воспаление конъюнктивы.

Специфического лечения не существует. Рекомендовано отменить йодоформ и использовать другой антисептик.

Условия и срок хранения

Лекарственное средство должно храниться в плотно закрытом флаконе без доступа света. Температура при хранении от -20 до +20 градусов. Длительность хранения 5 лет.