

Инструкция по применению препарата салицилово-цинковая мазь

Латинское название: Pasta zinci salicylata

Код АТХ: D02AF

Действующее вещество: Салициловая кислота и Цинка оксид

Производитель (название компании и страна): Фармстандарт ОАО, Россия

Условия отпуска из аптеки: Без рецепта

Салицилово-цинковая мазь является антисептическим средством для наружного применения. Также известна под другим названием – «Паста Лассара». Помимо стандартных рекомендаций по применению (дерматиты, повышенное потоотделение) также подходит для терапии прыщей с явным воспалительным процессом. Благодаря своей пригодности в быту и дешевизне паста Лассара стала популярным средством.

Показания к применению

Показано использование мази от чрезмерной потливости стоп, для терапии дерматита, псориаза и экземы. В быту также имеет успех в лечении прыщей, благодаря своим выраженным подсушивающим свойствам. Нередко средство наносят на мокнущие раны, гнойники и язвы. Допустимо использовать пасту в терапии пролежней.

Состав препарата

Главные действующие компоненты – кислота салициловая и цинка оксид. Вспомогательные вещества – вазелиновая основа, крахмал из картофеля.

Лечебные свойства

Салицилово-цинковая мазь обладает выраженными антисептическими и подсушивающими эффектами. Оба главных действующих компонента оказывают эти эффекты. После нанесения препарата кожа обеззараживается и подсушивается. Можно лечить ранки на коже, которые склонны к намоканию. Мазь хоть и воздействует местно, но в системный кровоток может проникать.

Формы выпуска

Инструкция по применению указывает, что паста Лассара имеет беловато-желтый, непрозрачный цвет. Консистенция у медикамента густая. Имеет легкий, невыраженный запах. Упаковывается мазь в баночки, емкостью по 25 грамм. Цвет стекла баночек – темный, но прозрачный.

Способ применения

На поврежденную поверхность кожи паста наносится каждый день, но не более двух раз в сутки. Длительность лечения определяется доктором в индивидуальном порядке. Если беспокоят прыщи, то медикамент следует наносить точно.

При беременности и ГВ

Не рекомендуется использовать мазь при беременности и во время грудного кормления.

Противопоказания

Мазь противопоказана при:

- Беременности и в период лактации
- Язве желудка и двенадцатиперстной кишки
- Анемии
- Диатезе
- Нарушении функции печени и почек
- Плохой свертываемости крови.

Меры предосторожности

С осторожностью применяют данный медикамент люди, чья кожа склонна к чрезмерной сухости. Следует обращаться бережно со средством и не допускать его разбрызгивания в глаза. Если подобный инцидент произошел, то следует промыть глаза большим количеством проточной воды.

Перекрестные лекарственные взаимодействия

Нет данных.

Побочные эффекты

Если наносить вещество на большие участки тела и долгое время, то возможна легкая потеря слуха, усиленное потоотделение, шумы в ушах и помутнение в глазах.

Передозировка

Передозировка обычно характеризуется усилением побочных явлений. В самых запущенных случаях могут развиваться: ухудшения в работе печени и почек, ухудшение дыхательной функции, судороги и развитие геморрагического диатеза.

Условия и срок хранения

Хранить средство следует не более четырех лет в прохладном и темном месте, подальше от детей.