Инструкция по применению препарата папаин-актив

Латинское название: papain-active

Код АТХ: D03B

Действующее вещество: млечный сок папайи

Производитель (название компании и страна): ООО «Медфлорина», Россия

Условия отпуска из аптеки: без рецепта

Папаин актив – это пептидное вещество природного происхождения, которое эффективно применяется в составе комплексного лечения и профилактики межпозвоночных грыж и остеохондроза.

Показания к применению

Остеохондроз, межпозвоночная грыжа (в комбинации с аналогом – карипазимом).

Состав препарата

Главные действующие компоненты: папаин. Дополнительные вещества, входящие в состав геля: оливковое масло, очищенная вода, гелеобразователь, глицерин, консерванты, катон.

Лечебные свойства

Как указывает инструкция, папаин актив способен оказывать обезболивающие и противовоспалительные эффекты при местном нанесении на кожу в области пораженного места. Также средство улучшает в тканях циркуляцию крови, способствует омоложению кожных покровов при регулярном использовании.

Формы выпуска

Папаин-актив выпускается в форме геля для наружного применения. Продается в синих баночках, емкостью в 100 мл. Консистенция гелеобразная, прозрачная.

Способ применения

Инструкция указывает, что гель папаин актив наносится легкими массажными движениями в область шеи, лопаток или поясницы. Растирать средство нужно до полного впитывания раз в сутки, перед сном. Курс лечения составляет 1-2 месяца.

При беременности и грудном вскармливании

Гель папаин актив допустимо назначать беременным и кормящим только после строгих показаний врача.

Противопоказания

Нельзя использовать ЛС, если в области больного места есть в наличии сильный воспалительный процесс кожного покрова. Также средство противопоказано к применению при индивидуальной непереносимости или реакции гиперчувствительности.

Меры предосторожности

Не следует расплескивать гель, чтобы он не попал в глаза, также его нельзя есть. Если такое случилось или гель взял нечаянно ребенок (съел, брызнул в глаза), то больной глаз нужно промыть обильной струей из крана, а при попадании в желудок желательно вызвать рвоту.

Перекрестные лекарственные взаимодействия

Нет сведений о взаимодействии папаина с другими лекарственными средствами.

Побочные эффекты

В редких случаях возможно развитие аллергических реакций. В таком случае препарат отменяется.

Передозировка

Нет данных.

Условия и срок хранения

Гель хранится в сухих и прохладных условиях подальше от детей полтора года с момента изготовления. Оптимальный температурный диапазон – от +5 до +20 градусов тепла.