

Витрум кардио ОМЕГА-3

Форма выпуска

Капсулы

Состав

1 капсула содержит:

Активные вещества: 1000 мг Омега-3-полиненасыщенных жирных кислот этиловые эфиры в т. ч. в состав которых входят: Эйкозапентаеновая кислота (EPA) 300 мг, Докозагексаеновая кислота (DHA) 200 мг, Альфа-токоферол (Витамин E) 2 мг;

Состав оболочки капсулы: желатин – 261,7 мг, глицерол – 117,8 мг, вода очищенная – 235,5 мг.

Упаковка

В упаковке 30 и 60 шт.

Фармакологическое действие

ВИТРУМ КАРДИО ОМЕГА-3 - натуральный лекарственный препарат для эффективной профилактики и комплексного лечения атеросклероза и его осложнений.

Препарат ВИТРУМ КАРДИО ОМЕГА-3 представляет собой комплекс незаменимых полиненасыщенных жирных кислот семейства омега-3 (омега-3 ПНЖК) - эйкозапентаеновой (ЭПК) и докозагексаеновой (ДГК). Особенностью препарата является оптимально подобранная терапевтически эффективная дозировка омега-3 ПНЖК в одной капсуле и отсутствие в нем насыщенных жирных кислот.

- Оказывает нормализующее влияние на обмен липидов крови
- Способен предупреждать развитие атеросклероза и способствует замедлению роста атеросклеротических бляшек
- Предупреждает образование тромбов в кровеносных сосудах
- Уменьшает риск развития инфаркта и инсульта
- Оказывает нормализующее действие на уровень артериального давления

Препарат представляет собой комбинацию полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) семейства Омега-3 эйкозапентаеновой кислоты (EPA), докозагексаеновой кислоты (DHA) и витамина E.

Препарат применяется при нарушениях липидного обмена, обусловленных выраженной гипертриглицеридемией, обладает противовоспалительным действием. Способствует нормализации содержания ЛПНП и ЛПОНП, изменению жидкостных свойств мембран клеток и повышению функциональной активности мембранных рецепторов, что способствует улучшению липидно-клеточного взаимодействия липопротеидов с ферментами, улучшению метаболизма липопротеидов. ВИТРУМ КАРДИО ОМЕГА-3 способствует нормализации обмена липидов крови.

Антиагрегатное действие препарата связано с замещением арахидоновой кислоты в составе фосфолипидов мембраны клеток или с торможением агрегации тромбоцитов в результате влияния на липидные свойства рецепторов с тромбоксаном A₂/простагландином H₂. Противовоспалительное действие обусловлено уменьшением продукции метаболитов простагландина E₂, достигаемое включением в биосинтез эссенциальных жирных кислот. Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты тормозят воспаление, уменьшают способность артерий к вазоконстрикции, снижают агрегацию тромбоцитов.

Данный комплекс незаменимых полиненасыщенных жирных кислот применяется для нормализации липидного обмена и снижения риска развития атеросклероза.



Витамин Е обладает антиоксидантной активностью, участвует в тканевом дыхании и других важнейших процессах тканевого метаболизма; защищает клетки и ткани от повреждающего действия избыточных количеств свободных радикалов и перекисных продуктов.

Витрум кардио ОМЕГА-3, показания к применению

Профилактика дислипидемии (нарушение липидного обмена); комплексная терапия нарушений липидного обмена, в том числе включающая диету, статины.

Противопоказания

- Повышенная чувствительность к компонентам препарата ВИТРУМ КАРДИО ОМЕГА-3,
- обострение хронического холецистита и панкреатита,
- обострение заболеваний гепатобилиарной системы,
- желчнокаменная болезнь;
- патологические состояния, включающие геморрагический синдром.
- Детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

В период беременности и грудного вскармливания рекомендуется принимать препарат ВИТРУМ КАРДИО ОМЕГА-3 только по назначению врача.

Способ применения и дозы

ВИТРУМ КАРДИО ОМЕГА-3 рекомендуется принимать взрослым внутрь, запивая водой:

- с профилактической целью – по 1 капсуле в сутки, через 30 минут после еды;
- с лечебной – по 1 капсуле 2-3 раза в сутки, через 30 минут после еды.

Курс лечения не менее 3 месяцев. Повторные курсы по рекомендации врача.

Побочные действия

Аллергические реакции. Расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта: гастроэзофагеальный рефлюкс или отрыжка с запахом или привкусом рыбы, тошнота, рвота, диарея.

При длительном применении в больших дозах возможно обострение хронического панкреатита.

Особые указания

Не превышайте рекомендованную суточную дозу.

Лекарственное взаимодействие

Одновременный прием с пероральными антикоагулянтами способствует риску увеличения времени кровотечения. Одновременный прием с варфарином не приводит к развитию геморрагических осложнений (однако при комбинированном приеме или после прекращения курса лечения препаратом необходим контроль протромбинового времени).

Не рекомендуется одновременный прием с фибратами. Во время приема препарата «ВИТРУМ КАРДИО ОМЕГА-3» не рекомендуется прием других препаратов, содержащих витамин Е.

Передозировка

Симптомы: боль в эпигастральной области, диспептические расстройства (тошнота, рвота, диарея).

Лечение: симптоматическое, отмена препарата.

Условия хранения

В сухом месте при температуре 10-30°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.