

# Грудной эликсир

## Латинское название

Elixir pectoralis

## Форма выпуска

Эликсир

## Состав

100 мл эликсира содержит:

*Активные вещества:* солодки экстракт густой 20,7 г; анисовое масло 0,34 г; аммиака раствор концентрированный 25% 1,38 г;

*Вспомогательные вещества:* спирт этиловый (этанол) 90% — 20,41 мл; вода очищенная — до 100 мл.

## Упаковка

Флакон 25 мл.

## Фармакологическое действие

Грудной эликсир - отхаркивающее.

## Фармакодинамика

Отхаркивающий эффект грудного эликсира обусловлен действием входящих в его состав компонентов:

*Солодки экстракт густой* обладает противовоспалительным и отхаркивающим свойствами, которые связаны с содержанием в нем глицирризина, стимулирующего активность реснитчатого эпителия в трахее и бронхах, а также усиливающего секреторную функцию слизистых оболочек верхних дыхательных путей;

*Анисовое масло* обладает отхаркивающим действием, обусловленным содержанием в масле анетола, который способствует рефлекторному возбуждению дыхания, повышению активности реснитчатого эпителия дыхательных путей и усилению секреции слизистой оболочкой гортани, трахеи и бронхов;

*Аммиак* обладает раздражающим действием, которое приводит к возбуждению окончаний чувствительных нервов в верхних дыхательных путях и рефлекторной стимуляции центра дыхания.

## Показания

В качестве отхаркивающего средства при инфекционно-воспалительных заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой (в т.ч. трахеит, трахеобронхит, бронхит).

## Противопоказания

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- бронхиальная астма;
- гастрит;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения;
- беременность;
- период грудного вскармливания.

*С осторожностью:* заболевания печени, алкоголизм, ЧМТ, заболевания головного мозга, детский возраст.

## Способ применения и дозы

*Внутри*, 3–4 раза в день. Взрослым — по 20–40 капель, детям назначают на прием столько капель, сколько



лет ребенку. Перед применением следует разводить в небольшом количестве воды.

Курс лечения — 7-10 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

### **Побочные действия**

Возможны аллергические реакции, в отдельных случаях может наблюдаться диарея.

### **Особые указания**

В составе препарата содержится 90% этиловый спирт. Содержание абсолютного этилового спирта в одной капле препарата составляет 0,0075 г, в максимальной разовой дозе для взрослых — до 0,3 г, в максимальной суточной дозе — до 1,2 г.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и занятию другими потенциальными опасными видами деятельности.* В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении транспорта и занятиях другими потенциальными опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

### **Лекарственное взаимодействие**

При необходимости можно применять в сочетании с антибиотиками и другими ЛС. Не следует применять одновременно с противокашлевыми препаратами, т.к. это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

### **Передозировка**

*Симптомы:* при длительном применении с превышением указанных дозировок возможны гипокалиемия, повышение АД, появление периферических отеков вследствие нарушения водно-солевого обмена.

*Лечение:* симптоматическое.

### **Условия хранения**

При температуре не выше 20 °С.

### **Срок годности**

3 года