

Суприма-Бронхо

Форма выпуска

Сироп

Состав

5 мл сиропа содержит:

Активные вещества: адатоды сосудистой экстракт густой 30 мг; солодки голой экстракт густой 20 мг; куркумы длинной экстракт густой 10 мг; базилика священного экстракт густой 10 мг; имбиря лекарственного экстракт густой 10 мг; паслена желтоплодного экстракт густой 5 мг; перца длинного экстракт густой 5 мг; кардамона настоящего экстракт густой 5 мг;

Вспомогательные вещества: сахароза — 1500 мг; сорбитола 70% раствор — 187,5 мг; камедь гуаровая — 17,5 мг; левоментол — 2,5 мг; пропиленгликоль — 50 мг; натрия бензоат — 20 мг; метилпарагидроксибензоат — 7,5 мг; пропилпарагидроксибензоат натрия — 2,5 мг; бронопол — 1,5025 мг; карамель — 42,5 мг; лимонной кислоты моногидрат — 7,5 мг; ароматизатор фенхеля — 0,01625 мл; ароматизатор малиновый — 0,01 мл; хлористоводородная кислота — q.s.; вода очищенная — до 5 мл.

Упаковка

Флакон 100 мл.

Фармакологическое действие

Комплексный фитопрепарат, обладающий бронхолитическим, муколитическим, отхаркивающим и противовоспалительным действием.

Адатода васика оказывает муколитическое, отхаркивающее и спазмолитическое действие.

Солодка голая оказывает анальгезирующее, успокаивающее, противовоспалительное, отхаркивающее действие.

Куркума длинная оказывает антисептическое, противовоспалительное, анальгезирующее действие.

Базилик священный оказывает отхаркивающее, жаропонижающее и антисептическое действие.

Имбирь настоящий оказывает противовоспалительное действие.

Паслен желтоплодный оказывает противовоспалительное, отхаркивающее, жаропонижающее, противоаллергическое действие.

Кардамон настоящий оказывает вирусостатическое и бронхолитическое действие.

Перец длинный оказывает антибактериальное и противоаллергическое действие.



Фармакокинетика

Действие препарата Суприма-Бронхо является совокупным действием его компонентов, поэтому проведение фармакокинетических исследований не представляется возможным.

Суприма-Бронхо, показания к применению

В качестве средства симптоматической терапии при следующих заболеваниях и состояниях:

- воспалительные заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем (фарингит, ларингит, трахеит, бронхит, пневмония, начальные стадии коклюша);
- хронические заболевания органов дыхания (бронхит курильщиков, лекторский ларингит).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; детский возраст до 3 лет.

С осторожностью: сахарный диабет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата в период беременности и грудного вскармливания возможно только в том случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Способ применения и дозы

Внутрь. Перед употреблением взбалтывать. *Взрослым и детям старше 14 лет* — по 1-2 ч.ложки (5-10 мл) 3 раза в день; *детям 3-5 лет* — по 1/2 ч.ложки (2,5 мл) 3 раза в день, *6-14 лет* — по 1/2-1 ч.ложке (2,5-5 мл) 3 раза в день. Курс лечения — 2-3 недели.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции на компоненты препарата.

Особые указания

Одновременно по показаниям возможно применение противомикробных средств. Пациентам с сахарным диабетом необходимо учитывать, что в 1 ч.ложке (5 мл) препарата содержится 1,5 г сахарозы, что соответствует 0,15 ХЕ.

Влияние лекарственного препарата на способность управлять транспортными средствами, механизмами. До настоящего времени случаев влияния препарата на способность управлять транспортными средствами и механизмами отмечено не было.

Лекарственное взаимодействие

Препарат не следует применять одновременно с противокашлевыми ЛС, т.к. это затрудняет откашливание разжиженной мокроты. По показаниям возможно одновременное применение препарата с противомикробными средствами.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Срок годности

3 года