Адрианол

Латинское название: Adrianol.

Код АТХ: R01AB01.

Действующие вещества: трамазолин и фенилэфрин;

Производитель: фармацевтическая компания «Здравле». Производственные мощности расположены в Сербии и Actavis Group hf. в Исландии.

Капли назальные Адрианол для детей отпускаются из аптек только по рецепту врача.

Общие сведения

Препарат «Адрианол» оказывает противоотечное и сосудосуживающее действие. Это капли в нос для детей для местного использования. После закапывания препарата снижается отечность, уменьшается количество отделяемого из носа, нормализуется дыхание и давление в евстахиевой трубе, гайморовых пазухах, в системе среднего и внутреннего уха.

Показания к применению

Препарат показан к назначению при лечении заболеваний носа, сопровождающихся ринореей – синуситы, риниты, гаймориты, в качестве вспомогательной терапии при аллергических реакциях. Кроме этого, капли назальные используют во время подготовки перед проведением оперативных вмешательств и малых манипуляций в системе носа, в пластической хирургии.

Состав препарата

Основными компонентами «Адрианол» детский являются фенилэфрин и трамазолин в количествах по 0,5 мг на 1 мл раствора. Форма для взрослых содержит 1 мг фенилэфрина и 1,5 мг трамазолина на 1 мл капель.

Формы выпуска

Капли «Адрианол» выпускают во флаконах-капельницах на 10 мл. На внешний вид препарат представляет собой прозрачную слегка вязкую жидкость.

Капли в нос «Адрианол». Инструкция по применению

Выбор дозировки лекарственного средства зависит от возраста пациента. Для детей используют «Адрианол детский», для пациентов старше 18 лет – взрослую форму.

Эффективные дозировки препарата составляют:

- Дети от 1 года до 5 лет – по 2 капельки в каждый носовой ход 3 раза в сутки

•От 5 до 18 лет – используют «Адрианол детский» по 3 капли в каждую ноздрю 4 раза в сутки

•От 18 лет и старше – по 3 капли 4 раза в сутки препарата «Адрианол» во взрослой дозировке.

Курс лечения составляет 7 дней. Если насморк продолжается, то следует обсудить с врачом замену препарата. Капли «Адрианол» не используются при лечении хронических процессов.

Использование при беременности

Необходимость использования капель Адрианол при беременности следует обсудить с ЛОР-врачом или с гинекологом. Хотя в инструкции период ожидания ребенка не указан, как абсолютное противопоказание, но в это время следует учитывать насколько польза для матери выше, чем предполагаемый риск для плода.

Противопоказания и меры предосторожности

Инструкция на «Адрианол» гласит, что сосудосуживающие капли не назначают в следующих случаях:

•Индивидуальная чувствительность к компонентам

•Гипертиреоз

•Феохромоцитома

•Почечная недостаточность

•Глаукома

•Некомпенсированная гипертония

•Ишемическая болезнь

•Атеросклероз

•Ринит с атрофией слизистой оболочки

•Детский возраст до 1 лет для «Адрианол детский»

•Эпилепсия

•Период лактации

•Детский возраст до 7 лет для назальных капель «Адрианол».

Перекрестные лекарственные взаимодействия

Не рекомендуется использовать лекарственное средство одновременно с приемом антидепрессантов и ингибиторов МАО, так как развивается не купируемая артериальная гипертензия.

Перерыв между эпизодами лечения должен составлять не менее 10 дней.

Побочные эффекты

Побочные эффекты «Адрианола» подразделяют на местные и общесистемные.

По месту введения могут наблюдаться следующие неприятные ощущения:

- Боль
- Жжение
- Сухость слизистой
- Развитие атрофических процессов
- Изменение вкуса
- Нарушение обоняния
- Отечность носоглотки
- Ринорея.

Общесистемные побочные эффекты – это различные аллергические реакции, тошнота, скачки АД, головные боли.

Описание передозировки

Не следует капать препарат чаще и в больших, чем рекомендовано инструкцией дозах. Симптоматика передозировки:

- Повышение АД
- Тошнота и рвота
- Брадикардия
- Нарушение сна
- Шоковое состояние

При появлении признаков передозировки ребенка следует показать врачу. Лечение препаратом отменить.

Условия и срок хранения

Срок использования препарата составляет 3 года с момента выпуска. Специальных условий для хранения не требуется. Достаточно темного и прохладного места.