Триакутан

Латинское название: Triacutan

Код АТХ: D07 XC01

Действующее вещество: Бетаметазон, Клотримазол, Гентамицин

Производитель: ВАТ Киевмедпрепарат, Украина

Условия отпуска из аптеки: Без рецепта

Дерматологические поражения кожи требуют вмешательства эффективных лекарственных средств. К одним из таких относят Триакутан, он отличается антибактериальной, противогрибкой активностью, помогает устранить воспалительный процесс. Лекарство широко используется при лечении многих патологий кожи, возникших по причины бактерий и грибков. Продается в удобной форме крема и мази, используемых для наружного нанесения.

Показания к применению

Применение Триакутана показано при такой диагностике:

- Дерматозные состояния, которые поддаются излечиванию глюкокортикостероидными медикаментами
- Инфекционные патологии с повторным заражением, вызванные восприимчивостью флорой чувствительной к веществам лекарства
- Микозы кожных покровов, спровоцированные дрожжевыми грибами и дерматофитами. (микоз ног, эпидермофития в паху, отрубевидный лишай и пр.)
- Хронические и острые грибковые кожные патологии.

Состав препарата

Основа крема: клотримазол, сульфат гентамицина, дипропонат бетаметазона.

Второстепенные компоненты: пропиленгликоль, гидрофосфат натрия, минеральное масло, цетостеариловый спирт и некоторые другие.

Активные вещества мази аналогичны крему, дополнением выступают: октилдодеканол, мягкий парафин, минеральное масло.

Лечебные свойства

Медикаментозное влияние крема и мази Триакутан обусловлено, входящими в его состав активными компонентами. Бетаметазон проявляет противовоспалительную, противозудную и антиаллергенную действенность. Он предупреждает нагромождение лейкоцитов на воспаленных участках, укрепляет стенки сосудов, устраняет отечностью. Клотримазол активно борется с грибком, стафилококками, лямблиями, трихомонадами, разрушая клетки и препятствуя их размножению. Гентамицин оказывает широкое антибактериальное влияние.

Формы выпуска

Крем светловатого оттенка, отпускается в тубах по 15 мг, в упаковке из картона.

Мазь почти белая, однородная, отпускается в тубах, массой 15 мг.

Способ применения

Мазь и Триакутан крем практикуется как местное средство для наружного нанесения. В основном крем часто рекомендуют при острых формах, а мазь более подходит при хронических поражениях. Рекомендуется накладывать на больные места 2 раза в сутки, через 12 часов. Продолжительность курса фиксируется врачом и зависит от формы недуга и действенности средства. Если не наблюдается должного эффекта после 3-4 недель лечения, медикамент отменяют.

При беременности и грудном вскармливании

Во время вынашивания малыша и при его кормлении лекарство не используется. Его применение может негативно сказаться на развитии плода и вызвать серьезные проблемы у ребенка при лактации.

Противопоказания

Нельзя практиковать медикамент при таких диагнозах:

- Туберкулезное заболевание кожи

- Симптомы ветряной оспы
- Розовые угри
- Кожная симптоматика после введения вакцины
- Варикозное расширение вен
- Бляшечный псориаз
- Периоральный дерматит
- Проявления сифилиса на коже
- Инфекционные и бактериальные недуги без проведения необходимой терапии
- Высокая чувствительность к составляющим медикамента.

Меры предосторожности

Избегать контакта медикамента с открытыми ранами.

Не допускать попадания в глаза.

Перекрестные лекарственные взаимодействия

Триакутан имеет свойство понижать влияние антигрибковых средств, таких как Нистатин, Натамицин и пр.

Высокая дозировка Дексаметазона способна понизить действенность указанного препарата.

Местное использование гидроксибензойной кислоты усиливает активность Триакутана.

Побочные эффекты

Лечение мазью может сказаться отрицательными проявлениями, в особенности, если применяются окклюзионные повязки, среди них наиболее часто отмечаются:

- Ощущение зуда, высыпания, раздражение
- Сухость, потница, шелушение
- Акне, различного рода дерматиты
- Кожная мацерация
- Нарушение пигментации кожи.

По большей части такая симптоматика не требует отмены медикамента, обычно понижается доза, и указанные признаки быстро исчезают.

Передозировка

Долгосрочное практикование средства не допустимо, это приводит к привыканию и отсутствию терапевтического эффекта. В результате этого нередко развивается почечная недостаточность, синдром Кушинга. В этой ситуации прибегают к симптоматической терапии, назначаемой лечащим доктором.

Условия и срок хранения

По инструкции к применению сохранять Триакутан нужно в прохладном месте, при температуре не выше 25 градусов тепла. Период пригодности не боле 2 лет.