Латинское название: Agnucaston
Код АТХ: G02CX
Действующее вещество: Экстракт плодов обыкновенного прутняка
Производитель: BIONORICA AG, Германия
Условие отпуска из аптеки: По рецепту

Лекарственное средство Агнукастон является растительным препаратом, которое используется при сбоях в менструальных циклах, ПМС и мастодинии.

Показания к применению

Препарат показан к приему при:

- Прогестероновой недостаточности, которая привела к проблемам с циклом
- ПМС
- Неприятных чувствах в груди: тяжесть, боль, отеки и др.

Состав препарата

В состав таблеток входит основное действующее вещество – экстракт плодов обыкновенного прутняка, в среднем количестве 4 мг и лекарственные растения или их части (около 40 мг):

- Крахмал картофельный
- МКЦ
- ММА
- Кремния диоксид коллоидный
- Моногидрат лактозы
- Соль магния и стеариновоя кислота
- Е171
- Е172
- Е132
- Полимер этиленгликоля
- Тальк
- Повидон.

Капли также содержат основной действующий компонент, этиловый спирт, повидон, собит, сахаринат натрия, ПАВ, воду и ароматизатор перечной мяты.

Лечебные свойства

Препарат направлен на регуляцию количества половых гормонов.

ЛС работает из-за дофаминергического действия основного действующего вещества. Агнукастон нормализирует выработку пролактина. Если этого не делать, то в организме нарушится выработка гонадотропинов, а этого уже чревато отклонениями в созревании фолликулов, что приведет к сбою процесса овуляции.

Сбой в цикле и неприятные ощущения в груди вызывает дисбаланс прогестерона и эстрадиола. Именно на нормализацию этого соотношения и направлено ЛС.

Формы выпуска

Таблетки небольшие, круглые и зеленые. Без рисок и вкраплений. Вкус и запах отсутствуют. Фасуются в блистеры по 15 штук. В фиолетово-белую или бело-зеленую упаковку с силуэтом девушки вложено 2 или 4 блистера и инструкция по применению.

Капли продаются в стеклянной упаковке по 50 и 100мл из темно-коричневого стекла с капельницей. Препарат жидкий, с небольшим запахом спирта и обыкновенного прутняка. Фасуются в бело-зеленую упаковку с девушкой на этикетке. Внутри, кроме флакона, вложена инструкция по применению. Возможно наличие осадка на дне упаковки, что является нормой.

Способ применения

Агнукастон в таблетках принимают по утрам, по 1й штуке. Нельзя разжевывать или разламывать препарат. Запивать водой или соком. Курс – 30 дней.

Капли Агнукастон пьют один раз в сутки по 40 капель. Перед применением требуется хорошо взболтать флакон. Курс – месяц.

Если после приема ЛС терапевтический эффект не наступил, то следует обратиться к врачу.

При беременности и грудном вскармливании

Агнукастон противопоказан при беременности. Применение при грудном вскармливании также невозможно, если не переводить ребенка на смеси.

Противопоказания и меры предосторожности

К противопоказаниям относятся:

- Чувствительность к одному или нескольким компонентам в составе
- Гестация.

Внимание! Капли нельзя принимать после курса избавления от алкоголизма из-за наличия спирта в составе. В состав таблеток входит лактоза, которая может статьи причиной проблемой с ЖКТ.

Перекрестные лекарственные взаимодействия

Если одновременно применять Агнукастон и с антагонистами дофаминовых рецепторов, то это приведет к снижению эффекта от лечения как первым, так и вторым.

Побочные эффекты

Среди побочных эффектов были выявлены аллергии разных видов, изменение скорости психической деятельности, спутанность сознания и появления несуществующих образов (галлюцинации).

Передозировка

Передозировки Агнукастона в инструкции по применению от производителя не описаны.

Условия и срок хранения

Препарат хранится 36 месяцев с даты производства. Оптимальная температура хранения – до 25 градусов.