

Латинское название: Daktarin

Код АТХ: D01AC02

Действующее вещество: Миконазол

Производитель: Janssen Pharmaceutica, Бельгия

Pharmasol, Великобритания

Орион Корпорейшн, Финляндия

Условия отпуска из аптек: Рецептурный

Антимикозный и противобактериальный препарат Дактарин используется в наружной и местной терапии. Оказывает негативное влияние на дрожжевые грибки, дерматофиты и грамположительные микробы. Удобен в применении из-за большого количества форм выпуска.

## Показания к применению

Дактарин оказывает антимикозное действие. Пагубно влияет на болезни дермы и ногтей: эпидермофитию, трихофитию, кожные и ротоглоточные кандидозы, разноцветные лишай, кандидозы ЖКТ, вульвовагинальные инфекции.

Препарат используют как профилактическое средство от появления грибков из-за терапии антибиотиками и ИГКС.

## Состав

Основное активное вещество – Миконазол. Его концентрация следующая:

- Крем – 2мг
- Гель оральный – 2мг
- 1 свеча – 100мг
- Аэрозоль – 0,16 мг.

## Лечебные свойства

Лекарственное средство борется с разнообразными грибками: дерматофиты, дрожжевые и т.д. Убивает грамположительные микроорганизмы.

Работа лекарственного средства обусловлена нарушением процесса соединения эргостерола клеточной мембраны и микробов. Лечит зуд, но при этом кислотно-щелочной баланс и состав полезной микрофлоры внутри влагалища не меняет.

При использовании любой формы выпуска Дактарина абсорбирующее действие мало. Частичная или полная потеря активности биологически активного вещества происходит в печени. Препарат выводится почками.

# Формы выпуска

## Крем

Дактарин выпускается в виде белого однородного крема в тубиках по 15, 30 или 70 грамм. Фасуется в металлические тубы и картонные коробки, в которые также вложена инструкция по применению. Внешний вид лекарства может отличаться из-за разных производителей.

## Гель

Дактарин в геле выпускается для лечения болезней во рту. На вкус приятный, по консистенции липкий и не жидкий. Фасуется в металлические тубы по 20, 40 и 80 грамм. Внешний вид зависит от производителя. В упаковке также, кроме препарата, находятся инструкция по применению и мерная ложечка. Препарат не продается.

## Свечи

Суппозитории представляют собой мягкие небольшие яйцеобразные белые или светло-бежевые свечи. Фасуются в контурные ячейковые упаковки по 3 штуки. Упаковка карточная, белая, с зелеными полосами наверху. Внутри также лежит бумажная инструкция по применению.

## Аэрозоль или спрей

Спрей выпускается в баллонах с сжатым воздухом и мелкодисперсным распылителем. При нанесении мгновенно подсушивает язвочки и раны. Не имеет запаха и вкуса. Продается в металлических бело-зеленых баллонах, на котором присутствует шрифт Брайля для слабовидящих.

## Способ применения и дозы

Крем используют дважды в сутки путем нанесения небольшого количества препарата на больную кожу и втирания мягкими массажными движениями. Используют до полного исчезновения симптомов болезни и несколько суток после (для профилактики).

Спрей хорошо взбалтывают и распыляют на расстоянии 8-10 см от больной дермы дважды в день. Оптимально выбрать утро и вечер перед сном. Для ускорения терапии также сбрызгивают изнутри обувь и носки\колготки. Курс длится месяц.

Если существует возможность заражения после посещения общественных мест: бассейны, бани, сауны и т.д., то перед походом обрабатывают межпальцевые складки и стопы.

Свечи (1-2 штуки) или крем вводят интравагинально перед сном. Курс для свечей – 2 недели, для крема – 1 неделя.

Для терапии слизистой рта используют оральный гель по половине мерной ложки 4 раза в день. Для того чтобы ускорить выздоровление, производитель

рекомендует гель сначала держать ЛС во рту несколько минут, а только потом проглотить. Курс от 2 до 6 недель.

Если женщина лечится от вагинальных болезней, то параллельно с ней также проходит курс и ее половой партнер, иначе терапия окажется неэффективной.

При лечении грибка на ногах ногти срезают максимально коротко, это ускорит выздоровление и увеличит положительный эффект.

### **При беременности и грудном вскармливании**

Разрешается прием наружных форм выпуска препарата во время гестации и лактации, т.к. ЛС не попадает в общий кровоток, однако необходимо быть под строгим контролем врача во время лечения.

## **Противопоказания и меры предосторожности**

Препарат запрещен к использованию, если имеются следующие состояния:

- Чувствительность к компонентам препарат
- Беременность и грудное вскармливание, если используются суппозитории
- Болезни почек
- Заболевания печени

С осторожностью принимать препарат, если у больного есть сахарный диабет или нарушение микроциркуляции.

## **Перекрестное лекарственное взаимодействие**

Действие от фенитоина, не прямых антикоагулянтов и пероральных гипогликемических препаратов усиливается, если они принимаются с Дактарином.

## **Побочные эффекты**

При использовании лекарственного средства возможно появление нежелательных действий:

- Нарушения в работе ЖКТ (тошнота, диарея) при приеме внутрь
- Реакции кожного покрова на наружный прием
- Реакция гиперчувствительность при любом способе приема.

## **Передозировка**

Превышение рекомендованных доз в течении длительного времени вызывает раздражение/зуд кожи, нагревание дермы в месте нанесения.

Лечение – отказ от приема ЛС.

## **Условия и срок хранения**

Хранить в темном, сухом и прохладном месте при температуре не более 25 градусов. Срок годности – 24 месяца с даты производства, указанной на упаковке.