

Латинское название: Triacortum

Код АТХ: D07AB09

Действующее вещество: Триамцинолон (Triamcinolonum)

Производитель: АКРИХИН, РФ

Условия отпуска из аптек: Безрецептурный

Триакорт – это мазь, созданная на триамцинолоне и направленная на снятие воспалений и устранение следов аллергии.

Показания к применению

Мазь Триакорт является частью комплексной терапии и направлена на избавление от:

- Экземы
- Псориаза
- Дерматитов
- Фотодерматозов
- Нейродермитов
- ДКВ
- Аллергических реакций.

Состав

В одном грамме лекарственного средства содержится 1 мг триамцинолона ацетонида. В качестве вспомогательных веществ были использованы:

- Глицерин
- Димексид
- Е1520
- Вазелин
- Октадекановая кислота
- Очищенная вода
- Воск.

Лечебные свойства

Лекарство имеет противовоспалительный и антигистаминный эффекты.

Основной действующий элемент является умеренно активным глюкокортикостероидом. Медикамент имеет свойство накапливаться в слоях кожи, что уменьшает чувство зуда и количество выделяемой из-за воспалений жидкости.

Замедление течения или полное подавление освобождения медиаторов из тучных клеток, моноцитов, базофилов и эозинофилов обусловлено противовоспалительным механизмом действия.

Препарат направлен также на стабилизацию мембран тучных клеток.

Основной компонент уменьшает реакцию к аллергену и увеличивает работу гистаминазы. Именно это приводит к снижению количества гистамина.

Для устранения выраженности отека и проницаемости стенок сосудов, ЛС подавляет работу ферментов лизосом.

Из-за формы выпуска всасываемость медикамента мала, но ее можно повысить, если использовать окклюзионную повязку.

Форма выпуска

Мазь имеет белый или желтовато-белый оттенок без вкраплений. Консистенция густая. Имеет легкий запах вазелина.

Фасует в металлические бело-синие тубы по 10 гр. Вместе с мазью в картонную коробку, имеющую такой же дизайн, как и у тубы, вложена инструкция по применению.

Способ применения

Триакорт наносят 1-3 раза в сутки тонким слоем. Курс полностью зависит от заболевания и варьируется от 5 до 10 дней. Если недуг после 10 суток все еще проявляет себя, то мазь применяют до 25 дней.

Можно использовать под окклюзионную повязку. В этом случае сначала применяют большую концентрацию медикамента, а потом 0,025%.

Такая терапия имеет длительный эффект и хорошо борется с возможностью обострения.

Нельзя использовать, если очаги поражения очень большие и на коже лица.

При беременности и грудном вскармливании

Крем можно применять в период вынашивания малыша и кормления грудью, но только если ожидаемая польза от препарата выше, чем все возможные риски.

Противопоказания и меры предосторожности

Триакоот запрещен к приему, если у больного имеются:

- Высокая чувствительность к элементам средства
- Инфекции на коже
- Язвочки
- Почечная недостаточность
- Грибки и вирусы на поверхности дермы
- Туберкулез кожи
- Периоральный дерматит
- Сифилис кожи
- Предраковые состояния
- Гестация.

Лекарственное средство не предназначено для внутривенного введения.

К мерам предосторожности относят:

- Отеки
- Ожирение
- Болезни желудочно-кишечного тракта
- Психические отклонения.

Для максимальной эффективности рекомендовано дополнительно принимать продукты с высоким содержанием кальция и пить витамин D.

Использование для детей младше 6 лет не приветствуется, возраст от 6-12 лет требует строгого контроля со стороны специалиста. Длительный прием у всех возрастов запрещен.

Если параллельно с Триакоотом применяются внутрь другие глюкокортикостероиды, то эффект будет усилен.

Побочные эффекты

Триакоот может дать следующие нежелательные эффекты:

- Развитие эритемы
- Трофика дермы
- Вторичные инфекции
- Гипертрихоз.

Случаи передозировки лекарственным средством не зарегистрированы.

Условия и срок хранения

Препарат хранят в холодильнике, температурный режим – от 10 до 15 градусов. Срок годности – 24 месяца.