

Латинское название: Gistan H

Код АТХ: D07AC13

Действующее вещество: Мометазон

Производитель: OXFORD Laboratories, Pvt. Ltd., Индия

Условия продажи: Рецептное

Условия хранения: до 25°

Срок годности: не более 3 лет

Гистан-н – это крем, который борется с дерматитами и псориазом. В состав добавлен мометазон.

Показания к применению

Мазь Гистан-н часто назначается дерматологами для терапии кожного покрова и его придатков при ярко выраженном воспалении и сильном зуде.

К ним относят:

- Дерматиты атопического вида
- Псориазы
- Дерматиты себорейного типа.

Состав и форма выпуска

На один грамм крема приходится 1 мг основного активного компонента – фууроата мометазона.

Для большей эффективности и легкости применения необходимо было присоединение:

- Белого мягкого парафина
- Эмульсионного воска
- Натриевая соль лимонной кислоты
- Жидкого парафина
- Очищенной (дистиллированной) воды
- Полимера этиленгликоля
- Хлорокрезола
- E1520.

Гистан-н производится в виде белого или почти белого легкого и нежирного крема. Консистенция средней плотности. Запаха практически нет. После нанесения кожу не стягивает, а одежду не пачкает. Исходя из отзывов, расход очень экономный.

Медикамент упакован в тубу из пластика по 30 мг. Упаковывается в ярко-розовую картонную коробку с надписью «Гистан-н», внутри инструкция по применению.

Лечебные свойства

Основной лечебный элемент – мометазон – это искусственно созданный глюкокортикостероид. Средство имеет антизудный, противовоспалительный и противоэкссудативный эффекты. ГКК настроен на увеличение выработки белка, снижающего или полностью подавляющего липокортины и ферменты фосфолипазы А2. Они, в свою очередь, участвуют в биологическом синтезе медиаторов воспаления. Лечебный эффект оказывается из-за остановки освобождения арахидоновой к-ты, которая и является предшественницей воспаления.

Второе действие основного компонента – предупреждение скопления нейтрофилов по типу «краевой», именно это и уменьшает работу цитокинов и снижает количество вырабатываемого экссудата. Миграция микрофагов, грануляция и инфильтрация также подавляются Мометазоном.

Благодаря лечению уменьшается выраженность воспаления. Данный эффект достижим из-за ингибирования выработки хемотаксиса, который иначе именуют как «поздний аллергический ответ». Останавливается развитие немедленной аллергии.

Исходя из опыта, регулярные аппликации борются с аллергическим дерматитом в течении 21 дня.

Крем Гистан-н имеет слабую абсорбцию. Нанесение препарата на здоровые участки кожи (если, конечно, не используется окклюзионная повязка) отобразится на обмен кровотоке в количестве 40% от дозировки.

Нанесение на раненые или больные кожные покровы увеличивает показатель абсорбции медикамента.

Способ применения и дозы

Рассматриваемый медикамент подходит только для наружного использования!

Крем наносят единообразно в сутки тонким слоем (до 4мм) на пораженные участки, захватывая здоровые края кожи.

Длительность терапии от 7 до 28 дней, более точно определит врач, исходя из выраженности болезни, вероятности появления побочных эффектов, переносимости препарата и т.д.

В педиатрии лекарство разрешено только после 2х лет.

Полноценные исследования, относительно безопасности рассматриваемого препарата у будущих мам и кормящих, не проводились. Однако доказано, что ГКК может преодолевать плацентарный барьер. Поэтому, чтобы не допустить нежелательного воздействия на состояние ребенка и мамы, гинекологи советуют воздержаться от применения мази в течении долгого периода времени и/или на больших участках кожного покрова.

Основной активный элемент имеет возможность выделения с молоком матери, поэтому на время терапии ГВ приостанавливают, если необходимо использовать мазь длительно и/или на обширных поверхностях дермы.

Противопоказания и меры предосторожности

Препарат запрещен к использованию, если у пациента есть или подозревается:

- Сифилис
- Туберкулез кожи
- Дерматит периорального типа
- Розовые угри
- Поствакцинозная реакция
- Грибок
- Инфекции вирусного и бактериального вида, включая герпес
- Период гестации
- Возраст до 24 месяцев
- Период грудного кормления
- Повышенная чувствительность в компонента препарата.

Относительными противопоказания стали:

- Нанесение мази на лицевую часть
- Применение окклюзионных повязок
- Работа на интертригинозной поверхности

Все пациенты должны уточнить диагноз, если после 14 дней лечения положительного эффекта не наблюдается.

В большинстве случаев побочные эффекты появляются из-за окклюзионных повязок, долгого и обширного применения препарата.

Пациенты обязаны систематически узнавать состояние гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы.

Не допускать попадания мази в глаза.

Может появиться небольшое раздражение в области нанесения препарата. Это объясняется работой E1520, который находится в составе средства. В этом случае лечение останавливают.

ГКК способен притормозить ранозаживляющий эффект.

В случае резкой отмены медикамента после длинной терапии может начаться «синдром рикошета».

Побочные эффекты и передозировка

К побочным эффектам относят:

- Синдром Иценко-Кушинга
- Недостаточность надпочечников
- Онемение, мурашки
- Дерматит периорального типа
- Угри
- Фолликулит
- Зуд в месте нанесения
- Растяжки
- Потница
- Атрофия кожного покрова
- Изменение цвета кожи
- Избыточный рост волос

- Присоединение вторичной инфекции
- Контактный дерматит аллергического вида
- Мацерация.

В случае передозировки оказывают терапию развившихся синдромов.