

Инструкция по применению колломака

Латинское название: collomask

Код АТХ: D11AF

Действующее вещество: салициловая кислота

Производитель (название компании и страна): Хайнрих Мак Нахф, Германия

Условие отпуска из аптеки: купить можно в аптеке без рецепта

Условия хранения: при температурном режиме до 25 градусов тепла, подальше от детей

Срок годности: до 5 лет.

Колломак – немецкий аналог салициловой кислоты, используемый обширно в дерматологической сфере медицины.

Показания по применению

Колломак назначают при наличии таких кожных повреждений и новообразований:

- Бородавки и мозоли
- Гиперкератоз при заболевании псориазом
- Кондиломы с острыми концами
- Ороговелый слой эпидермиса
- Большие орозоленные участки на теле.

Состав препарата

В одной баночке лекарственного средства содержится 2 грамма салициловой кислоты, 200 мг полидоканола и 500 мг молочной кислоты. Емкость лекарственного средства – 10 грамм. Дополнительно в состав входят: этилцеллюлоза, ацетон и дибутилфталат.

Лечебные свойства

Колломак раствор обладает выраженными кератолитическими свойствами. Салициловая кислота сильно подсушивает кожу, вызывает размягчение и отшелушивание, также обладает легкими антисептическими свойствами. Молочная кислота эффективно разрушает бородавочные новообразования, а полидоканол обезболивает, заживляет и предупреждает возникновение рецидивов. При местном использовании медикамент не попадает в системный кровоток.

Формы выпуска

Раствор 10 мл в упаковке из темного стекла, прозрачный со специфическим запахом. Продается в картонной коробке.

Способ применения

Инструкция к средству колломак указывает, что лекарство используется исключительно для местной обработки. Лекарство наносится в виде одной капли раствора на пораженный участок тела 2 раза в день. Если бородавки или мозоли локализируются на пятках и подошвенной области, то стопы предварительно распариваются в тазике с горячей водой, а затем только наносится лекарство. Длительность терапии и дозировка упирается в количество пораженных мест на теле и тяжесть самого состояния. Взрослым рекомендуется в сутки использовать не более одного флакона. Примерно через 4 дня нанесения мозоли удаляются. При необходимости повторяется повторный курс лечения через некоторое время.

Детям разрешено использовать не более 1 мл средства в сутки. Также в детском возрасте нельзя обрабатывать сразу несколько участков. Для того, чтобы обезопасить здоровую кожу вокруг больной от агрессивного воздействия лекарства, следует нанести цинковую мазь или детский жирный крем. Длительность терапии у детей и взрослых не должна превышать более семи дней подряд.

При беременности и грудном вскармливании

Средство можно использовать кормящим и беременным.

Противопоказания и меры предосторожности

К ним относятся:

- Недостаточность функции почек
- Непереносимость или сверхчувствительность в индивидуальном порядке
- Младенческий возраст.

С осторожностью: нужно стараться, чтобы медикамент не попадал на слизистые оболочки, в особенности на глаза и в рот. Колломак не наносится на бородавки, располагающиеся в области лица и гениталий. После использования флакон плотно закрывается.

Перекрестные лекарственные взаимодействия

Средство не сочетается с цинка оксидом (тальк) и резорцином. Салицилат, подобно димексиду, улучшает проницаемость кожи к другим медикаментам, наносимым наружно.

Побочные эффекты

К ним относятся:

- Аллергические проявления
- Жжение, зуд и гиперемия в месте нанесения.

Передозировка

Нет конкретных сведений, но салициловая кислота может сильно иссушить кожу.