

## ***Регецин: инструкция по применению геля***

Латинское название: Regecin

Код АТХ: D10AX

Действующее вещество: Гиалуронат цинка

Производитель: Дионис, Россия

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта

Условия хранения: t от 5 до 25 С

Срок годности: 2 года

Регецин – ЛС, которое применяется для проведения лечебной терапии при угревых высыпаниях, включая комедоны. Обладает сильным регенерирующим, а также противовоспалительным воздействием.

### ***Показания к применению***

Регецин гель назначается к использованию при:

- Себорейном дерматите
- Проявлениях демодекоза
- Различных проявлениях угревой болезни.

Применяется данный препарат и в косметологии с целью активизации регенерационных процессов в тканях непосредственно после осуществления лазерных процедур. Эффективен гель Регецин от морщин, так как устраняет несовершенства кожного покрова.

### ***Состав***

Основным компонента препарата Регецин от прыщей является гиалуронат цинка, также гель включает ряд других компонентов:

- Карбопол
- Натрия гиалуронат и гидроксид
- Сорбат калия
- Хлорид цинка
- Подготовленную воду.

### ***Лечебные свойства***

Дерматологическая мазь проявляет противомикробное, выраженное регенерирующее, а также противовоспалительное воздействие.

Регецин гель можно считать высокоэффективным протиугревым ЛС, лечебное действие обеспечивается за счет его антимикробных и противовоспалительных свойств. Во время лечения препарат устраняет не только очаги воспалительного процесса, но и последствий

на кожном покрове после его нейтрализации. То есть Регецин подойдет и для лечения пятен после акне.

Основной механизм действия ЛС заключается во взаимодействии такого вещества как гиалуроновая кислота с белками, в результате чего образуется ряд соединений, а именно дисперсионный матрикс, который способствует повышению эластичности и упругости кожи. Компоненты данного препарата ускоряют регенерационные процессы, протекающие в поврежденных тканях, улучшается микроциркуляция крови.

Еще один важный компонент препарата – цинк, он принимает активное участие в процессе деления клеток, под его влиянием устраняются патогенные клетки и вирусы непосредственно в очагах воспалительного процесса.

### *Форма выпуска*

Гель с противоугревым действием имеет вид однородной прозрачной суспензии, которая расфасована во флаконы-тубы объемом 15 г. Внутри пачки размещена 1 туб. с лекарственным препаратом.

### *Способ применения*

Наносится препарат на основе гиалуроната цинка тонким слоем с последующим равномерным распределением на проблемном участке кожного покрова после его предварительного очищения.

При угревой сыпи назначают гель дважды за сутки на протяжении 4-6 нед., но не более 3 мес. При начальной стадии угревой болезни достаточно проведение монолечения препаратом, при средней и тяжелой форме – комбинированная терапия с иными ЛС, например, антибактериальными препаратами или ГКС.

Для профилактики возникновения акне рекомендуется применять препарат двукратно на протяжении 7 дн.

При тяжелой стадии себорейного дерматита лучше всего наносить лекарство 2-3 раза в день, терапия Регецином длится 4 нед.

Регецин от морщин и после лазерной коррекции потребует наносить на протяжении 5-10 дн. Заживление мелких ран после лазерных процедур проходит лучше, если дополнительно использовать другие регенерационные средства.

### *Применение при беременности, ГВ*

Препарат с особой осторожностью назначается данной группе пациентов. Не следует применять ЛС длительно.

### *Противопоказания и меры предосторожности*

Чтобы исключить гиперчувствительность к препарату, лучше всего протестировать ЛС: нанести крем на определенную область кожного покрова и проследить за реакцией. При чрезмерном шелушении, гиперемии, а также жжении потребуется проконсультироваться с

дерматологом. Кроме чрезмерной восприимчивости к ЛС, есть ряд других противопоказаний:

- Нарушение целостности кожи, а также наличие глубоких ран
- Бронхиальная астма
- Наличие ожогов, вызванных химическими препаратами
- Новообразования.

ЛС не используется в педиатрической практике.

Стоит исключить попадания лекарства на слизистые оболочки, а также на поверхность ран.

### *Перекрестные лекарственные взаимодействия*

Нет сведений.

### *Побочные эффекты*

Во время использования дерматологического препарата могут наблюдаться такие реакции:

- Чувство локального покалывания, стянутость кожного покрова
- Покраснение кожи в местах аппликаций
- Появление зуда, а также сильного жжения
- Проявление аллергии: сильные высыпания, дерматиты, отек Квинке.

При выраженной побочной симптоматике лучше заменить Регецин аналогами, их порекомендует лечащий врач.

### *Передозировка*

Не зарегистрировано.