

Латинское название: Vita-IoduroI

Код АТХ: S01XA

Действующее вещество: Хлористый калий, хлорид магния, вит.РР, аденозин

Производитель: Лаборатория Сиба Вижн Фор, Франция

Условия отпуска из аптек: Рецепт не требуется

Условия продажи: от 15 до 25 градусов

Срок годности: 3 года, после вскрытия – 30 дней

Вита-Йодурол – это офтальмологические капли, которые борются с различными видами катаракт. В составе находится комплекс активных веществ.

#### *Показания к применению*

Капли для глаз Вита-Йодурол назначаются в случае необходимости проведения профилактических действий или терапии разнообразных видов катаракты, в которые входят врожденные и вторичные типы, а также вызванные из-за возраста или травмирования.

#### *Состав и форма выпуска*

На один миллилитр препарата приходится 2мг кальция хлорида, 3 мг E511, 1 мг аденозина и 0,3 мг ниацина.

Дополнительно были добавлены:

- Хлористый калий
- Натрия гидроксид
- Бензалкония хлорид
- Дистиллированная вода.

Лекарство производится в виде прозрачных капель для глаз, которые не имеют никаких примесей или запаха. Упаковываются во флакон из полумягкого пластика без цвета по 10 мл. Помимо этого, у упаковки имеется дозатор-капельница.

### *Лечебные свойства*

Капли для глаз Вита-Йодурол способствует улучшению питания хрусталика, нормализации кровоснабжения и обменных процессов в органах зрения. Основные рабочие элементы работают над усилением метаболизма в тканях хрусталика и периорбитальной циркуляции. Также они способствуют остановке процессов накопления протеина в самом хрусталике.

Подробная информация о фармакокинетике (абсорбция, СМАХ, время полувыведения, способы вывода из организма и т.д.) производителем представлена не была.

### *Способ применения и дозы*

Инструкция по применению глазных капель Вита-Йодурол предписывает использовать препарат только местно, путем закапывания 2х капель в конъюнктивальный мешочек трижды в сутки.

Если пациенту крайне необходимо использовать сразу несколько офтальмологических средств, то надо выждать между их приемами от 15 минут и более.

Нежелательно носить контактные линзы, в которых более 70% воды, во время закапывания. Жесткие линзы должны быть сняты перед процедурой, а надеть их можно через 20 минут

Запрещено прикасаться кончиком флакона к больному глазу, чтобы не допустить инфицирования.

Серьезных исследований безопасности применения капель для беременных и кормящих не производилось. По этой причине медикамент запрещен к приему во время данных состояний.

### *Противопоказания и меры предосторожности*

Глазные капли запрещены к применению при:

- Индивидуальной высокой чувствительности к одному или сразу нескольким веществам
- Гестация и лактация
- Детский возраст до 18 лет.

Также лекарство запрещено использовать внутрь или вводить через капельницы или инъекции.

### *Побочные эффекты и передозировка*

К негативным реакция организма на применение лекарства относятся:

- Аллергия на любые элементы
- Покраснения белков глаз
- Отеки
- «Песок»
- Боязнь света
- Увеличенная слезоточивость.

Случаи передозировки на данный момент не зафиксированы.

Лекарственное средство прекрасно переносится с другими препаратами.