# Глазные капли Неванак

Латинское название: Nevanac.

Код АТХ: S01BC10.

Действующие вещества: Непафенак.

Производитель: фармацевтический концерн «Алкон Лабораториз». Производственные мощности располагаются на территории Великобритании и Бельгии.

Глазные капли «Неванак» являются препаратом рецептурного отпуска.

## Общие сведения

Препарат относится к группе НПВС. Активное вещество при местном применении проникает через роговицу и при помощи ферментов трансформируется в лечебную форму «Амфенак». Основной механизм действия капель – это блокирование выработки простагландин-Н-синтазы, необходимой для продукции медиаторов воспалительного процесса.

Неванак капли оказывают противовоспалительное, обезболивающее и противоотечное действие, не изменяя при этом показатели внутриглазного давления. Максимальная концентрация активного вещества в глазных средах наблюдается через 1 час после закапывания капель. Метаболиты выводятся через мочевыводящую систему. В незначительном количестве – с каловыми массами.

## Показания к применению

Неванак показан для назначения после офтальмологических оперативных вмешательств по поводу катаракты в качестве обезболивающего, противовоспалительного и противоотечного средства.

## Состав препарата

Основное действующее вещество – непафенак в количестве 1 мг на 1 мл раствора. Прочие компоненты являются вспомогательными.

## Формы выпуска

На внешний вид капли представляют собой однородную суспензию. Цвет варьируется от светло-желтого до оранжевого. Раствор упакован в пластиковый флакон-капельницу объемом 5 мл.

Цена препарата зависит от географического положения торговой точки:

## Капли «Неванак». Инструкция по применению

Согласно руководству к лекарственному средству эффективная дозировка составляет 1 капля 3 раза в сутки. Препарат вводится местно в конъюнктивальный мешок. Предварительно флакон встряхивают.

Начинать использование лекарственного средства следует в 1 сутки после оперативного вмешательства. Длительность терапии определяет врач, но не менее 14 дней. Первое введение препарата проводят за 30 минут до начала хирургических манипуляций.

## Использование при беременности

Беременность и лактация являются абсолютными противопоказаниями к назначению капель для глаз «Неванак». Исследования на животных доказали токсичность основного действующего компонента для плода. Исследования определили увеличение пороков развития и выкидышей, снижение жизнеспособности эмбрионов.

## Противопоказания и меры предосторожности

Противопоказаний к назначению глазных капель немного. Препарат запрещен в следующих случаях:

- Детский возраст
- Период гестации
- Кормление грудью
- Гиперчувствительность к компонентам
- Непереносимость прочих препаратов группы НПВС, аспирина
- Астма в анамнезе
- Аллергическая форма ринита
- Обструкция легких в хронической форме.

Пациентам, принимающим лечение каплями «Неванак» следует избегать яркого солнечного света. Кроме этого, длительное использование может спровоцировать истончение и разрыв тканей роговицы, увеличить

сроки выздоровления. У пациентов, принимающих антикоагулянты, имеющих заболевания, связанные с нарушением свертываемости крови, непафенак может вызвать кровотечение во время хирургического вмешательства.

Препарат купирует симптоматику различных заболеваний системы зрительного анализатора. Поэтому пациент должен находиться под динамическим наблюдением офтальмолога.

Не следует прикасаться к капельнице флакона. Это может привести к бактериальному загрязнению лекарственного средства. Непафенак провоцирует нечеткость зрения, поэтому во время лечения не рекомендуется управлять транспортными средствами и выполнять работы, требующие точности и повышенного внимания.

## Перекрестные лекарственные взаимодействия

Запрещено использовать «Неванак» одновременно с прочими препаратами группы НПВС. Это может вызвать реакцию гиперчувствительности.

Одновременное применение с кортикостероидами местно снижает скорость заживления раневой поверхности.

Бензалкония хлорид, использующийся в качестве консерванта, может раздражать слизистую оболочку глаз, вызывать помутнение контактных линз, кератит. В случае применения глазных мазей их прием и закапывание «Неванак» должно быть разнесено по времени. Минимальный временной промежуток составляет 5 минут. В первую очередь вводят капли, затем мази.

## Побочные эффекты

Побочные эффекты при местном использовании капель проявляются редко. Чаще всего пациенты жаловались на ощущение инородного предмета в глазу, появление корочек на веках.

К редким побочным эффектам относятся:

- Гиперчувствительность
- Головные боли
- Ирит
- Блефарит
- Ощущение постороннего предмета
- Появление отека
- Помутнение, перфорация роговицы, образование рубцовой ткани

- Затуманивание и снижение остроты зрительного анализатора
- Ринорея, воспалительные процессы в придаточных пазухах
- Тошнота, рвота
- Накожные аллергические реакции.

При появлении неприятной симптоматики лечение препаратом следует немедленно прекратить.

## Описание передозировки

В медицинской статистике отсутствуют данные о случаях передозировки. При избыточном попадании раствора в конъюнктивальный мешок глаз следует промыть большим объемом воды.

Предположительно переизбыток действующего вещества способствует усилению проявлений побочных эффектов.

## Условия и срок хранения

Капли «Неванак» не требуют специализированных условий хранения. Рекомендуемый температурный режим – от 2 до 20 градусов. Закрытый флакон годен к применению в течение 4 лет с момента выпуска. Открытые капли – не более 4 недель с момент вскрытия упаковки.